

№1

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

Лекция №1

ТЕОРИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ

Рейтинг

Теория ошибок	5
Нелинейные уравнения и методы оптимизации	6
Численное интегрирование и дифференцирование	7
Приближение функций	7
Решение СЛАУ	15
Задача Коши	10
Методы многомерной оптимизации	20
<hr/>	
	70

Дополнительно:

Краевая задача	10
Контрольная работа №1	6
Контрольная работа №2	8
Контрольная работа №3	10

Критерии оценки:

5 > 93

4 > 85

3 ≤ 85

Список литературы


1. Киреев В.И., Пантелеев А.В. Численные методы в примерах и задачах [Электронный ресурс]: учеб. пособие. — СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2015. – 448 с. [Электр. ресурс]: ЭБС ЛАНЬ. – URL: — Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65043 .

2. Вержбицкий В.М. Основы численных методов : Учебник для вузов / В. М. Вержбицкий. - 2-е изд., перераб. - М. : Высшая школа, 2005. - 847 с.

№1

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА






Специфика вычислительной математики

- Вычислительная математика имеет дело не только с непрерывными, но и с дискретными объектами → погрешность метода;
- Погрешность вычислений в связи с ошибками округления;
- Имеет значение обусловленность задач, т.е. чувствительность решения к малым изменениям входных данных;
- Выбор вычислительного алгоритма, вообще говоря, влияет на результат вычислений;
- Важная черта численного метода – экономичность, т.е. требование минимизации числа операций.


Сложные вычислительные задачи, возникающие при исследовании физических, технических и иных проблем, можно разбить на ряд элементарных — таких, как вычисление интеграла, решение дифференциального уравнения и т.п.

Посмотрим, как решается любая реальная задача, например, нахождение светового потока конструируемой лампы. Одним из способов является эксперимент. Создадим лампу и измерим интересующую нас характеристику. Если характеристика оказалась неудачной, то изменим проект, сделаем новую лампу и т. д., пока не получим желаемые параметры. Ясно, что это слишком медленный и дорогой способ. Другой способ — **вычислительный эксперимент**.

Схема вычислительного эксперимента



Колебание математического маятника



$$l \frac{d^2 \varphi}{dt^2} + g \sin \varphi + \mu \frac{d\varphi}{dt} = 0$$

ИСТОЧНИКИ ПОГРЕШНОСТИ

1. **Погрешность математической модели.** Трение зависит от скорости не совсем линейно.
2. **Неточность задания исходных данных** (g , l , ...).
3. **Погрешность численного метода** – дифференциальное уравнение решаем, используя численный метод.
4. **Вычислительная погрешность**, связанная с конечной разрядной сеткой.

Иллюстрация понятия вычислительной погрешности

Вычисление синуса с помощью разложения в ряд Тейлора

Ряд сходится для любого значения x

Напишем программу для вычисления значения синуса
при:

$$X1 = \pi / 6 \approx 0.52366$$

$$X2 = 12\pi + \pi / 6 \approx 38.22277$$

№1


ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

```
#define EPS 1.e-8
#define X 0.52366
...
int i, k = 0;
double curr_sum = 0.0, curr_sum_old = 0.0, fact;
do {
    fact = 1.0;
    for ( i = 1; i <= 2*k+1; i++ )
        fact *= i;
    curr_sum_old = curr_sum;
    curr_sum += pow( -1, k ) * pow( X, 2*k+1 ) / fact;
    k++;
} while ( fabs( curr_sum - curr_sum_old ) > EPS );
```


Получаем результат!

Для $X_1 = 0.52366$: **0.500053...**

Для $X_2 = 38.22277$: **1.165079...**



Для $|X| < 1$: $|a_k|$
монотонно убывают



Для $|X| > 1$: $|a_k|$ сначала
возрастают, а затем убывают

Иллюстрация влияния выбора метода вычисления

Вычисление e^x может быть представлено как сумма сходящегося бесконечного ряда $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$. Применим ряд для $x = -5.5$.

При расчете с 5 знаками последовательно получим следующие числа:


$$e^{-5.5} = 1.0000 - 5.5000 + 15.125 - 27.730 + \dots \approx 0.0026363.$$

Мы ограничиваемся при суммировании 25 членами ряда, так как последующие слагаемые уже не меняют сумму. Удовлетворительный ли ответ получен? Истинный результат $e^{-5.5} = 0.0040867$, так что вычисление привело к ответу, не имеющему верных цифр.

Проблема таится в пятизначной арифметике и, вследствие этого, ошибках округления. Но увеличение разрядности не сильно поможет, да и обходится очень дорого. Лучше вычислить сумму для $x = 5.5$

и затем взять обратное число: $e^{-5.5} = \frac{1}{e^{5.5}} = \frac{1}{1 + 5.5 + 15.123 + \dots} = 0.0040865$.

Классификация погрешности



Абсолютные и относительные погрешности

Если x — точное значение некоторой величины, а x^* — известное приближение к нему, то **абсолютной погрешностью** приближенного значения x^* называют некоторую величину $\Delta(x^*)$, про которую известно, что

$$|x^* - x| \leq \Delta_x.$$

Пример:

$$x^* = 3.14$$

$$x = \pi = 3.141592\dots$$

$$\Delta_x = |3.14 - \pi| \leq 0.00159 \leq 0.002.$$

Относительной погрешностью приближенного значения x^* называют отношение его абсолютной погрешности $\Delta(x^*)$ к абсолютной величине числа x^*

$$\frac{\Delta(x^*)}{|x^*|} = \left| \frac{x^* - x}{x^*} \right| \leq \delta(x^*).$$

Пример:

$$x^* = 3.14$$

$$x = \pi = 3.141592\dots$$

$$\delta(x^*) = \frac{0.002}{3,14} 100\% \approx 0.63\%$$

Абсолютная погрешность менее информативна, чем относительная. Так, если точное значение некоторой Величины равно 0.00006 , а приближенное значение равно 0.00005 , то абсолютная ошибка составляет всего 10^{-5} , в то время как относительная ошибка составляет 0.2 , или 20% . С другой стороны, если точное значение равно 100500 , а приближенное значение равно 100000 , то абсолютная ошибка составляет 500 , хотя относительная ошибка составляет всего 0.005 , или 0.5% .

Значащими цифрами числа называются все цифры в его записи, начиная с первой ненулевой слева. Любое число можно представить в виде:

$$x = \alpha_1 \beta^n + \alpha_2 \beta^{n-1} + \dots + \alpha_m \beta^{n-m+1}, \text{ где}$$

α_1 — первая значащая цифра числа;

β — основание системы счисления; $0 \leq \alpha_i \leq \beta - 1, \quad i = 1, 2, \dots, m.$

Пример:

$$247.52 = 2 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0 + 5 \cdot 10^{-1} + 2 \cdot 10^{-2}$$

$$\beta = 10, \quad \alpha_1 = 2, \quad \alpha_2 = 4, \quad \alpha_3 = 7, \quad \alpha_4 = 5, \quad \alpha_5 = 2,$$

$$n = 2, \quad m = 5.$$

Значащая цифра α_k считается **верной**, если имеет место неравенство: $\Delta_x \leq \varpi \cdot \beta^{n-k+1}$, $0.5 \leq \varpi \leq 1$, в противном случае α_k — **сомнительная** цифра.

Чаще всего $\varpi = 0.5$.

В этом случае говорят, что число x имеет k верных знаков в **узком** смысле.

Если $\varpi = 1.0$, то число x имеет k верных знаков в **широком** смысле.

Относительная погрешность числа, содержащего k верных знаков, определяется соотношением:

$$\delta_x = \frac{\omega\beta^{n-k+1}}{\alpha_1\beta^n + \alpha_2\beta^{n-1} + \alpha_3\beta^{n-2} + \dots} \leq \frac{\omega\beta^{n-k+1}}{\alpha_1\beta^n} \leq \frac{\omega}{\alpha_1} \beta^{1-k} \leq \omega\beta^{1-k}$$

На практике обычно используется понятие числа S с верными знаками в узком смысле.

Тогда можно сказать, что абсолютная погрешность числа с верными знаками равна половине последнего разряда.

Пример 1.

Приближенное число $x = 0.3941$ получено с погрешностью $\Delta_x = 0.25 \cdot 10^{-2}$. Определить число верных знаков в его записи.

Согласно определению должно выполняться неравенство $0.25 \cdot 10^{-2} \leq 0.5 \cdot 10^{n-k+1}$, n — степень первой значащей цифры в записи числа, т.е. $n = -1$, тогда $0.25 \cdot 10^{-2} \leq 0.5 \cdot 10^{-1-k+1}$, $k = 2$, т.е. число имеет две верные цифры 0.39, а две следующие являются сомнительными.

Пример 2.

Определить абсолютную и относительную погрешность приближенного числа x , если в его записи только верные цифры : $x = 11.445$.

Решение:

$$n = 1; \quad k = 5;$$

$$\Delta_x \leq 0.5 \cdot 10^{1-5+1} = 0.5 \cdot 10^{-3}$$

$$\delta(x) = \frac{0.5 \cdot 10^{-3}}{11.445} = 4.368 \cdot 10^{-5}.$$

Определение погрешности функции по известным погрешностям аргументов

Основная задача теории погрешности заключается в следующем: по известным погрешностям некоторой системы параметров требуется определить погрешность функции этих параметров.

Для начала рассмотрим случай вычисления функции одного аргумента $y = f(x)$.

Абсолютная погрешность вычисления функции равна произведению абсолютной величины ее производной на абсолютную погрешность ее аргумента:

$$\Delta y = |f'(x)| \cdot \Delta x.$$

Рассмотрим относительную погрешность вычисления функции одной переменной. Учитывая, что $\Delta x = \delta x \cdot |x|$

$$\delta y = \frac{\Delta y}{|y|} = \frac{|f'(x)|}{|f(x)|} \cdot \Delta x = \left| x \cdot \frac{f'(x)}{f(x)} \right| \cdot \delta x.$$

Так как $\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{d \ln(f(x))}{dx}$, то δy можно записать так:

$$\delta y = \left| x \cdot \frac{d \ln(f(x))}{dx} \right| \cdot \delta x.$$

Для основных элементарных функций получаем следующие правила

Степенная функция $y = x^n$.

Абсолютная погрешность равна $\Delta_y = nx^{n-1} \Delta_x$.

Относительная погрешность степени равна относительной погрешности основания, умноженной на абсолютную величину показателя степени.

$$\delta y = \left| x \cdot \frac{nx^{n-1}}{x^n} \right| \cdot \delta x = |n| \cdot \delta x.$$

Показательная функция $y = a^x (a > 0)$.

Абсолютная погрешность показательной функции равна

$$\Delta_y = a^x \ln a \cdot \Delta_x.$$

Относительная погрешность показательной функции равна

$$\delta_y = \Delta_x \ln a.$$

Для функции $y = e^x$ получаем: $\delta_y = \Delta_x$.

Логарифмическая функция $y = \ln x$.

Абсолютная погрешность натурального логарифма числа равна относительной погрешности самого числа:

$$\Delta_y = \frac{1}{x} \Delta_x = \delta_x.$$

Тригонометрические функции.

Абсолютные погрешности синуса и косинуса не превосходят абсолютных погрешностей аргумента:

$$\Delta_{\sin x} = |\cos x| \Delta_x \leq \Delta_x, \quad \Delta_{\cos x} = |\sin x| \Delta_x \leq \Delta_x$$

Абсолютная погрешность тангенса и котангенса всегда больше абсолютной погрешности аргумента:

$$\Delta_{\operatorname{tg} x} = |1 + \operatorname{tg}^2 x| \Delta_x \geq \Delta_x, \quad \Delta_{\operatorname{ctg} x} = |1 + \operatorname{ctg}^2 x| \Delta_x \geq \Delta_x$$

Определение погрешности функции многих переменных
по известным погрешностям аргументов

Для непрерывно дифференцируемой функции

$$U = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

абсолютную погрешность можно вычислить по формуле:

$$\Delta_U = \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial U}{\partial x_i} \right| \Delta x_i,$$

где Δx_i - абсолютные погрешности аргументов x_i .

Относительная погрешность вычисляется по формуле:

$$\delta_U = \frac{\Delta_U}{|U|} = \sum_{i=1}^n \frac{\left| \frac{\partial U}{\partial x_i} \right|}{|U|} \cdot \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial \ln U}{\partial x_i} \right| \cdot \Delta x_i$$

Учитывая, что $\Delta x_i = \delta x_i |x_i|$, получим

$$\delta_U = \sum_{i=1}^n \left| x_i \frac{\partial}{\partial x_i} \ln U \right| \delta x_i.$$

Пример 1.

Пусть $U = x_1 + x_2$.

$$\Delta_U = \left| \frac{\partial(x_1 + x_2)}{\partial x_1} \right| \Delta x_1 + \left| \frac{\partial(x_1 + x_2)}{\partial x_2} \right| \Delta x_2 = 1 \cdot \Delta x_1 + 1 \cdot \Delta x_2 = \Delta x_1 + \Delta x_2$$

Абсолютная погрешность суммы равна сумме абсолютных погрешностей слагаемых.

Относительная погрешность суммы:

$$\delta_U = \left| \frac{\Delta(x_1 + \Delta x_2)}{x_1 + x_2} \right| = \frac{\Delta x_1 + \Delta x_2}{x_1 + x_2} = \frac{|x_1| \delta x_1 + |x_2| \delta x_2}{|x_1 + x_2|}.$$

Попробуем оценить границы относительной погрешности суммы. Выберем из всех относительных погрешностей наибольшую и тогда можно записать:

$$\delta_{x_1+x_2+\dots+x_n} = \frac{|x_1|\delta_{\max} + |x_2|\delta_{\max} + \dots + |x_n|\delta_{\max}}{|x_1 + x_2 + \dots + x_n|} = \delta_{\max}.$$

Таким образом, предельная относительная погрешность суммы положительных чисел не превосходит максимальной относительной погрешности слагаемых.

Пример 2.

Пусть $U = x_1 - x_2$.

$$\Delta_U = \left| \frac{\partial(x_1 - x_2)}{\partial x_1} \right| \Delta x_1 + \left| \frac{\partial(x_1 - x_2)}{\partial x_2} \right| \Delta x_2 = 1 \cdot \Delta x_1 + 1 \cdot \Delta x_2 = \Delta x_1 + \Delta x_2$$

Абсолютная погрешность разности равна сумме абсолютных погрешностей аргументов.

Относительная погрешность разности:

$$\delta_U = \left| \frac{\Delta(x_1 - x_2)}{x_1 - x_2} \right| = \frac{\Delta x_1 + \Delta x_2}{|x_1 - x_2|} = \frac{|x_1| \delta x_1 + |x_2| \delta x_2}{|x_1 - x_2|}.$$

Пример.

Пусть $x_1 = 2520$, $x_2 = 2518$.

Тогда

$$\Delta x_1 = \Delta x_2 = 0.5, \quad \delta x_1 = \delta x_2 = \frac{0.5}{2518} \approx 0.0002 \text{ (0.02\%)}.$$

Абсолютная погрешность:

$$\Delta(x_1 - x_2) = 0.5 + 0.5 = 1.$$

Относительная погрешность:

$$\delta(x_1 - x_2) = \frac{\Delta(x_1 - x_2)}{x_1 - x_2} = \frac{1}{2} = 0.5 \text{ (50\%)}.$$

При вычитании близких по значению чисел относительная погрешность может существенно возрасти...

Абсолютная и относительная погрешность вычисления произведения и частного приближенных чисел

При умножении и делении приближенных чисел складываются их относительные погрешности,
т.е. относительная погрешность выражения

$$y = \frac{a_1 a_2 \dots a_m}{b_1 b_2 \dots b_n}$$

оценивается величиной

$$\delta_y = \delta_{a_1} + \delta_{a_2} + \dots + \delta_{a_m} + \delta_{b_1} + \delta_{b_2} \dots \delta_{b_n}.$$

Абсолютная погрешность в этом случае вычисляется
через относительную погрешность: $\Delta_y = |y| \delta_y$

Определение допустимой погрешности
аргументов по допустимой погрешности функций

Эта задача имеет однозначное решение только для функции одной переменной $y = f(x)$: если эта функция дифференцируема и $f'(x) \neq 0$, то

$$\Delta_x = \frac{1}{|f'(x)|} \Delta_y.$$

Для функции нескольких переменных $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ решается только при наличии дополнительных ограничений. Если значение одного из аргументов трудно измерить с высокой точностью других аргументов, то погрешность именно этого аргумента надо согласовать с требуемой погрешностью функции.

Если значения всех аргументов можно одинаково легко определить с любой точностью, то обычно применяют **принцип равных влияний**, считая, что в формуле

$$\Delta_y = \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| \Delta x_i$$

все слагаемые равны между собой;

это дает следующую формулу:

$$\Delta x_i = \frac{\Delta y}{n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right|} \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

Пример.

Найти допустимую абсолютную погрешность приближенных величин $x = 15.2$, $y = 57^\circ$, для которых возможно найти значение функции $u = 6x^2(\lg x - \sin 2y)$ с точностью до двух десятичных знаков после запятой.

Решение.

Находим

$$u = 6x^2(\lg x - \sin 2y) = 6(15.2)^2(\lg 15.2 - \sin 114^\circ) = 371.9$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 12x(\lg x - \sin 2y) + 6x^2 \lg e = 88.54,$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -12x^2 \cos 2y = 1127.7.$$


По условию $\Delta_u = 0.005$. Тогда согласно принципу равных

влияний по формуле
$$\Delta x_i = \frac{\Delta y}{n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right|} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$


находим


$$\Delta_x = \frac{\Delta_u}{2 \left| \frac{\partial u}{\partial x} \right|} = \frac{0.005}{2 \cdot 88.54} = 0.28 \cdot 10^{-4}$$

$$\Delta_y = \frac{\Delta_u}{2 \left| \frac{\partial u}{\partial y} \right|} = \frac{0.005}{2 \cdot 1127.7} = 0.22 \cdot 10^{-5} = 0'' .45$$





ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА





ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА





ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

