


Дизартрия (из др.-греч. δυσ- приставка, означающая затруднённость, расстройство + ἀρθρόω — «сочленяю, соединяю») — нарушение произношения вследствие недостаточной иннервации речевого аппарата, которое возникает в следствии органичного поражения центральной нервной системы.

При этом наблюдается ограниченная подвижность губ, языка, мягкого нёба и других органов речи, что затрудняет артикуляцию (произношение).





Содержание:

- 1. Историческая справка 🖰
- 2. Причины дизартрии?
- 3. Виды дизартрии &
- 4. Лечение дизартрии в детском возрасте 💫

пренатальный период:

- заболевания матери в первую половину беременности (хронические заболевания матери: сердечно-сосудистые заболевания, туберкулез легких, тяжелые желудочно-кишечные заболевания и болезни печени, заболевания мочеполовой сферы);
- алкоголизм;
- токсикоз.


натальный период:



- асфиксия новорожденного;
- резус конфликт;
- черепно-мозговые травмы во время родов;
- кровоизлияние в мозг в результате резкой смены давления (при стремительных родах, при кесаревом сечении);
- неудачное применение средств родовспоможения (первичная причина).



Псевдобульбарная дизартрия



Локализация органического поражения	Характерные особенности
кора головного мозга	Нарушаются процессы глотания и жевания. Обильное слюноотделение и постоянное поперхивание.

