


# ДИЗАТРИЯ У ДЕТЕЙ







**Дизартрия** (из др.-греч. **δυσ-** — приставка, означающая затруднённость, расстройство + **ἄρθρω** — «сочленяю, соединяю») — нарушение произношения вследствие недостаточной иннервации речевого аппарата, которое возникает в следствии органичного поражения центральной нервной системы.

При этом наблюдается ограниченная подвижность губ, языка, мягкого нёба и других органов речи, что затрудняет артикуляцию (произношение).





# Содержание:

1. Историческая справка 
2. Причины дизартрии 
3. Виды дизартрии 
4. Лечение дизартрии в детском возрасте 

# ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД:

- заболевания матери в первую половину беременности (хронические заболевания матери: сердечно-сосудистые заболевания, туберкулез легких, тяжелые желудочно-кишечные заболевания и болезни печени, заболевания мочеполовой сферы);
- АЛКОГОЛИЗМ;
- ТОКСИКОЗ.






# НАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД:



- асфиксия новорожденного;
- резус – конфликт;
- черепно-мозговые травмы во время родов;
- кровоизлияние в мозг в результате резкой смены давления (при стремительных родах, при кесаревом сечении);
- неудачное применение средств родовспоможения (первичная причина).



# Псевдобульбарная дизартрия



**Локализация  
органического  
поражения**

кора головного  
мозга

**Характерные  
особенности**

Нарушаются  
процессы  
глотания и  
жевания.  
Обильное  
слюноотделение и  
постоянное  
поперхивание.

