



11. НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ

ИНТЕГРАЛ



11.1. ПЕРВООБРАЗНАЯ ФУНКЦИИ И НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ

Функция $F(x)$ называется первообразной функции $f(x)$ на промежутке X , если в каждой точке x этого промежутка

$$F'(x) = f(x)$$

Например, функция

$$F(x) = \frac{x^4}{4}$$

является первообразной для функции $f(x) = x^3$

поскольку

$$\left(\frac{x^4}{4}\right)' = x^3$$

Для заданной функции $f(x)$ ее первообразная определена не однозначно.

Например, функции

$$\frac{x^4}{4} + 1; \quad \frac{x^4}{4} + 2; \quad \dots \quad \frac{x^4}{4} + \textit{const}$$

тоже являются первообразными для функции x^3 .

В общем случае, если $F(x)$ – первообразная для функции $f(x)$, то функция вида $F(x)+C$ тоже является первообразной для $f(x)$, поскольку

$$(F(x) + C)' = F'(x) = f(x)$$

Из геометрического смысла производной
вытекает, что

$$F'(x)$$

есть угловым коэффициентом касательной к
кривой $y=F(x)$ в точке x .

*Найти первообразную для функции $f(x)$,
значит найти такую кривую $y=F(x)$,
что угловым коэффициентом
касательной к ней в произвольной
точке x равен значению $f(x)$.*

ТЕОРЕМА.

Если $F_1(x)$ и $F_2(x)$ - первообразные функции $f(x)$ на некотором промежутке X , то найдется такое число C , что будет справедливо равенство:

$$F_2(x) = F_1(x) + C$$

Доказательство:

Найдем производную разности первообразных:

$$\begin{aligned}(F_2(x) - F_1(x))' &= F_2'(x) - F_1'(x) = \\ &= f(x) - f(x) = 0\end{aligned}$$

Тогда по следствию из теоремы Лагранжа
найдется число C , такое что

$$F_2(x) - F_1(x) = C \quad \Rightarrow \quad \underline{F_2(x) = F_1(x) + C}$$



Из этой теоремы следует, что если $F(x)$ – первообразная для функции $f(x)$, то выражение

$$F(x) + C$$

задает все возможные первообразные для функции $f(x)$.

Совокупность всех первообразных для функции $f(x)$ на промежутке X называется неопределенным интегралом от функции $f(x)$.

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

Функция $f(x)$ называется подынтегральной функцией.

Выражение $f(x)dx$ называется подынтегральным выражением.

Пример.

$$\int x^3 dx = \frac{x^4}{4} + C$$

Интегрирование является операцией, обратной дифференцированию.

Для проверки правильности результата интегрирования надо продифференцировать результат и получить подынтегральную функцию.