



Клиникасы

- Ауырсыну эпигастрийда басталады -40% - бірт. Бүкіл іш қуыс, 2-6 сағаттан соң оң жақ мықын тұсында жиналақталады. Орташа, 1-2 рет құсу, лоқсу.
- Жалпы жағдайы қанағаттанарлық, дене қызуы субфебрильді, пульс-90, ҚҚ- өзгермейді.
- Пальпация:ОЖМ аймағында ауырсыну. Бұлшық-ет дефансы ширығуы Щеткин-Блюмберг симптомы оң.

Acute appendicitis



Ровзинга белгісі



"o <12
п

Синдромдар:

1. Диспепсиялық
 - жүрек айну, 1-2 рет құсу, нәжіс шығару бұзылысы
2. Ауырсыну
 - эпигастрий аймағында басталып 5-6 сағаттан оң жақ мықын аймағына ауысады – қатты емес, төзуге тұрарлық, сирек периодты, қозғалғанда күшейеді
3. Қабыну синдромы
 - температура (38-39)
 - лейкоцитоз, нейтрофилез, солға жылжу, ЭТЖ жоғарлауы

4. Перитонеальды синдром

- интоксикация
- Гиппократ беті
- Тілі жабындымен жабылған, іші желденген, тыныс алу актісіне қатыспайды (Винтер синдромы)
- құрттәрізді өсінді проекциясында ауырсыну аңықталады
- перистальтикасының нашарлауы + Щеткин-Блюмберг, Мендель, Крымов белгілері
- оң жақ аймағында бұлшық еттері қатаю

Симптомдар

- Кохер-эпиг.-оң жақ мықынаймағына көшуі
- Ситковский науқас сол жаққа жатқанда-ауырсыну.
- Ровзинг-сол жақтан төменгі тоқ ішекті басқанда, оң жақ мықын аймағы ауырсынуы
- Крымов –шап сақ-сы арқылы бармақпен тексергенде – ауырсыну
- Воскресенский (көйлек симптомы)

- Раздольский –оң жақ мықын аймағында тері гиперестезиясы, саусақпен ұрғылау
- Образцов-оң аяғын бүкпей көтергенде оң жақ мықын аймағында ауырсыну күшейеді
- Коупа – оң аяғын көтеріп жамбас-сан буынын ротациялы қозғалғанда ауырсынудың күшеюі немесе пайда болуы.
- Бартомье –Михелсон- сол жаққа жатқызып, оң жақ мықын аймағын басқанда ауырсынудың күшеюі
- Ректальды тексереді – жамбас пердесінің ауырсынуы

- Кушнеренко – жөтел симптомы
- Ленандер – қолтықасты мен тік ішектегі температурасындағы айырмашылық ($N < 1^{\circ}C$)
- Cremasterica – оң жақ жұмыртқаның тартылуы
- Иванов – сол жақ мықын аймағының бұлшықетінің атрофиясы
- Щеткин-Блюмберг перитонит симптомы
- Филатов – баланы ұйықтап жатқан кезінде пальпациялау
- Брендо – сол жақ қабырғаны басқанда оң жақ мықын аймағында ауырсыну болады (жүктілерде)

