





- **Делирий** – психическое расстройство, сопровождающееся нарушением сознания, истинными галлюцинациями, бредом, поведенческими и эмоциональными расстройствами



# ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ

- Lindesay (1999) сообщает, что термин «делирий» введён древнеримским учёным по имени [Авл Корнелий Цельс](#) в I веке н. э.



# Причины делирия

**первая** – состояния, обусловленные соматической патологией

---

тяжелые болезни внутренних органов и острая хирургическая патология

**вторая** – неврологические нарушения, возникшие вследствие заболевания или травмы


---

вирусные [энцефалиты](#) и менингоэнцефалиты, туберкулезный [менингит](#), неспецифический бактериальный менингит, субарахноидальное кровоизлияние, а также поражения головного мозга травматического, опухолевого или сосудистого характера

**третья** – острые и хронические интоксикации


---

интоксикации некоторыми лекарственными средствами (атропином, скополамином, кофеином, камфорой, фенамином), [абстинентный синдром](#) при [алкоголизме](#) и [барбитуромании](#)



# делирия

- Алкогольный
- Наркотический
- Травматический
- Послеоперационный
- Инфекционный
- Старческий
- Мусситирующий





Алкоголизм считается заболеванием, которое несет вред не только **здоровью** больного человека, но также и его **психике**, негативно воздействуя на его **социальные качества** и провоцируя **деградацию личности**.



# СИМПТОМЫ АЛКОГОЛЬНОГО ДЕЛИРИЯ

- появляется отвращение к спиртным напиткам (не всегда);
- алкоголик страдает резкой сменой настроения (от депрессивного до чересчур возбужденного);
- появляется чрезмерное возбуждение, мешающее больному сидеть на одном месте;
- возникает тремор конечностей;
- появляются нарушения сна (кошмары, бессонница, тревожный некрепкий сон и т.д.);
- возникновение пугающих образов после пробуждения;
- возникновение скоротечных зрительных и слуховых галлюцинаций.



- пожелтение белков глаз;
- повышенная потливость;
- непрекращающийся озноб;
- бледность кожи (или иногда краснота);
- специфический запах



# ГАЛЛЮЦИНАЦИИ И АЛКОГОЛЬНЫЙ ДЕЛИРИЙ

- Темное время суток – это благодатная пора для очередного приступа алкогольного делирия.
- больного во время белой горячки будет преследовать то, что внушает ему страх или отвращение в трезвом состоянии.
- Мимика алкоголика во время алкогольного делирия непосредственно отражает то, что он видит в своих галлюцинациях
- Тактильные галлюцинации
- Чувство того, что во рту находится посторонний предмет
- больной «общается» с объектами своих галлюцинаций





# ЧЕМ ОПАСЕН АЛКОГОЛЬНЫЙ ДЕЛИРИЙ?


Известны также случаи, когда алкоголики доходят до суицида. Обычно это происходит по двум причинам:

- больной пытается избавиться от страшных и навязчивых галлюцинаций;
- алкоголик подчиняется «голосам», звучащим в его голове, и приказывающим покончить жизнь самоубийством.



Алкогольный делирий крайне негативно влияет на организм человека. Среди негативных последствий влияния следующие:

- постоянно повышенная температура тела;
- повышение артериального давления;
- обезвоживание тела алкоголика;
- нарушение ритма сердечных сокращений.





# КОРСАКОВСКИЙ ПСИХОЗ

## возникает у больных, которые:

- находятся на третьей стадии алкоголизма;
- имеют возраст 40-50 лет;
- употребляют суррогаты, содержащие некачественный спирт (одеколон, некачественные спиртные напитки и т.д.).



## клинические симптомы:

- нарушение памяти алкоголика;
- фиксационная амнезия;
- невозможность воспроизвести короткую череду событий;
- невозможность запомнить имена людей, места и названия;
- дезориентация во временных рамках;
- дезориентация на местности;
- депрессивные состояния;
- наличие синдромов боязливости.





# Травматический делирий

Тяжелые черепно-мозговые травмы нередко приводят к коматозному состоянию, на выходе из которого может развиваться травматический делирий.

Это состояние сопровождается психомоторным возбуждением и галлюцинациями, часто отражающими обстоятельства травмы.

Продолжительность такого состояния может составлять 1-2 месяца.





# Старческий делирий

К сожалению, в старости у некоторых людей развивается деменция — приобретенное слабоумие. Оно имеет свои причины, среди которых и травмы, и алкоголизм, и различные внутренние болезни. Деменция представляет собой резкое снижение интеллекта, утрату приобретенных ранее знаний и постепенный распад личности.

Делирий на фоне деменции проявляется постепенно, симптомы меняются в течение дня, чаще всего ухудшение наступает в темное время суток.



## Симптомы старческого делирия:

- Тихая малопонятная речь,
- Повторяющиеся движения,
- Слабая концентрация внимания,
- Повышенная утомляемость,
- Неспособность критически мыслить,
- Слабые галлюцинации,
- Тревожность и депрессивное состояние,
- Ночные кошмары, которые старики принимают за реальные события.

Прогрессирующая деменция оставляет мало шансов на выздоровление. Светлые промежутки прояснения сознания при старческом делирии постепенно становятся все короче и реже, пока сознание полностью не окажется во власти психического расстройства.





# Послеоперационный делирий

Этот вид делирия встречается довольно редко. Он становится осложнением после тяжелых операций, чаще всего ему подвержены пожилые пациенты.

## Факторы риска:

- Общая или эпидуральная анестезия,
- Длительная операция,
- Большая кровопотеря,
- Нарушение водно-солевого обмена,
- Наличие в анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний, злоупотребления алкоголем.

Для послеоперационного делирия характерны общие симптомы.

Протекать он может как с возбуждением нервной системы, так и с ее угнетением.



# Инфекционный делирий

Данный вид делирия в основном развивается на пике заболевания на фоне очень высокой температуры.

Заболевания, которые могут вызвать инфекционный делирий:



- Тяжелые формы пневмонии,
- Детские инфекции,
- Тиф.





Инфекционный делирий может проявляться постепенно, тогда возможно заметить некоторые признаки наступающего психического расстройства:

- Больной становится суетливым и тревожным,
- Мечется в постели,
- Повторяет одни и те же вопросы и просьбы,
- Плачет,
- Отказывается от еды.




- Усиление симптоматики происходит к вечеру.
- движения больных становятся хаотичными
- речь бессвязной
- от страха они могут соскакать с постели, чтобы убежать от мнимых врагов

В пространстве больные не ориентируются, однако на вопросы о себе самих отвечают вполне адекватно.

К утру симптомы стихают, может даже наступить прояснение сознания, но к вечеру снова возвращается страх, тревога и повышенная возбудимость.

Характерной особенностью инфекционного делирия становится чувствительность к громким звукам и яркому свету.

Если больному не помочь, велик риск летального исхода от истощения.





# Мусситирующий

## делирий

С учетом клинической симптоматики и особенностей течения рассматривают мусситирующий делирий, который может возникать на фоне тяжелых соматических заболеваний, интоксикации сульфаниламидами, атропином, тяжелыми металлами или алкоголем. Данная форма болезни характеризуется глубоким расстройством сознания, двигательным возбуждением в виде простых стереотипий и отсутствием реакции на внешние раздражители. При отсутствии помощи состояние усугубляется до сопора и комы, возможен смертельный исход. После выздоровления наблюдается полная амнезия.



невозможно  
они полностью отрешены от  
окружающего

Общение с  
больными

**Делирий  
мусситирующий**

звуков  
слогов  
междометий

представляет собой  
тихое и невнятное  
произнесение  
отдельных

Речевое  
возбуждение

Синонимы:

делирий с бормотанием  
тихий бред

Делирий с  
некоординированным  
двигательным  
возбуждением

которое лишено целостных  
действии и однообразно по  
своим проявлениям

происходит в пределах  
постели

Больные  
что-то

- ✓ стряхивают
- ✓ ощупывают
- ✓ хватают
- ✓ разматывают несуществующий клубок ниток
- ✓ снимают с себя невидимые пушинки

действия часто определяют словом «обирание»