

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯНКИ
КУПАЛЫ»

Факультет биологии и экологии
Кафедра химии и химической технологии

Дипломная работа

**ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОФЛОРЫ ПРИ ВЫРАБОТКЕ И ХРАНЕНИИ
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОАО «ПИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»**

Исполнитель:

студентка 5 курса
специальности Биология
(биотехнология 1-310101-03)
Савсюк Яна Геннадьевна

Научный руководитель:

доцент кафедры биохимии,
Третьякова Елена Михайловна

Гродно, 2017



В наше время жизнь очень динамична, мы постоянно ощущает нехватку времени. Колбасные изделия превосходно помогают нам сократить время на приготовление завтрака, обеда, ужина.

Итак, **колбасные изделия** – это пищевые продукты, изготовленные из мясного фарша с солью и специями и подвергнутые термической обработке.

В процессе приготовления колбасных изделий мясной фарш обсеменяется микроорганизмами, которые попадают в него из разных источников.

Целью данной дипломной работы было оценить изменение динамики микрофлоры при выработке и хранении колбасных изделий на ОАО «Пинский мясокомбинат».

Для достижения цели были поставлены следующие **задачи:**

- проанализировать, как происходит обсеменение колбасного фарша микроорганизмами на всех этапах выработки колбасных изделий;
- определить соответствие нормативным показателям по содержанию количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) колбасного изделия сарделек вареных мясных при хранении.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

В ходе прохождения производственной практики на ОАО «Пинский мясокомбинат» было изучено:

- 1. изменение динамики КМАФАнМ на всех этапах производства колбасных изделий;*

КМАФАнМ

В составе КМАФАнМ (количество мезофильных анаэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов) представлены различные таксономические группы микроорганизмов – бактерии (*Proteus vulgaris*, *Bacillus subtilis*, *Clostridium sporogenes*), дрожжи, плесневые грибы. Их общая численность свидетельствуют о санитарно-гигиеническом состоянии продукта, степени его обсемененности микрофлорой.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КМАФАнМ

Метод определения КМАФАнМ посевом в агаризованные питательные среды основан на высеве продукта или его разведения в питательную среду, инкубировании посевов и подсчете всех выросших колоний.

Сырьё



Подготовка мяса



Посол



Составление колбасного фарша



Наполнение колбасной оболочки фаршем



Осадка




Термическая обработка:



- обжарка
- варка
- копчение и сушка

Рисунок 1 – Динамика изменения КМАФАнМ на всех этапах производства колбасных изделий



***2. изменение динамики КМАФАнМ
при хранении сарделек вареных
мясных «Толстячок люкс» высшего
сорта.***


Таблица 1 – Динамика изменения КМАФАнМ при хранении сарделек вареных мясных «Толстячок люкс» высшего сорта во время срока годности

Месяц	Сутки хранения	КМАФАнМ, КОЕ/см ³
март	1	1,2*10 ²
	5	1,3*10 ²
	10	1,5*10 ²
	15	1,6*10 ²
	20	2,1*10 ²
апрель	1	2,3*10 ²
	5	2,4*10 ²
	10	2,5*10 ²
	15	2,7*10 ²
	20	2,9*10 ²

Таблица 2 – Динамика изменения КМАФАнМ при хранении сарделек вареных мясных «Толстячок люкс» высшего сорта по истечению срока годности

Месяц	Сутки хранения	КМАФАнМ, КОЕ, см ³
март	25	1,1*10 ³
	30	1,2*10 ³
	35	1,4*10 ³
	40	1,5*10 ³
апрель	25	1,2*10 ³
	30	1,3*10 ³
	35	1,5*10 ³
	40	1,6*10 ³

Рисунок 2 – Динамика изменения КМАФАнМ при хранении сарделек вареных мясных «Толстячок люкс» высшего сорта



ВЫВОДЫ

1. На начальных этапах производства колбасных изделий, а именно: *подготовке мяса, посоле, составлении колбасного фарша, наполнении колбасной оболочки фаршем, осадке* наблюдается рост КМАФАнМ приблизительно в 6 раз.
2. При дальнейшей термической обработке (*обжарке, варке, копчении и сушке*) происходит снижение количества микроорганизмов приблизительно в 2000 раз.
3. При хранении в колбасном изделии – сардельках вареных мясных «Толстячок люкс» высшего сорта содержание КМАФАнМ в марте месяце составило: 154 ± 18 КОЕ/см³. В апреле количество микроорганизмов составило: 256 ± 17 КОЕ/см³, что полностью соответствует техническому регламенту Таможенного союза 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».
4. По истечению срока годности количество микроорганизмов в марте составило 1300 ± 25 КОЕ/см³ и превысило норму на 50%.
В апреле количество мезофильных и факультативно анаэробных микроорганизмов составило 1400 ± 24 КОЕ/см³ и превысило норму на 60%. Различия в обоих случаях статистически достоверны в сравнении содержания КМАФАнМ в течение срока годности.

Благодарю за внимание!