Болезни крови

ПЛАН

- **АНЕМИЯ**
- **ГЕМОФИЛИЯ**
- **СПИД**

АНЕМИЯ

- **Понятие:** - это патологическое состояния организма ребенка, при котором уменьшается количество Hb и эритроцитов в крови.
- **Причины:**

- Кровопотеря
- снижения функции красного костного мозга
- недостаточное количество витамина B_{12} и железа
- одностороннее молочное питание
- несвоевременное введение прикорма
- нерегулярный прием пищи
- острые детские инфекции
- ОРВИ
- глистные заболевания
- рахит

СИМПТОМЫ:

Заболевание развивается постепенно

- **Ведущие симптомы:**

- бледность кожи и слизистых оболочек
- резкое снижения аппетита
- отсутствие прибавки в весе
- одутловатость лица и отёк нижних конечностей
- головокружение, слабость, утомление
- t субфебрильная

- **Изменения в центральной нервной системе:** вялость, раздражительность, плаксивость, апатия, негативизм
- **Изменения в с.с.с.**:– **тахикардия, систолический шум**
- **Нарушения обмена веществ:** –дряблость и сухость кожи, шершавость, тусклый оттенок волос, малая двигательная активность
- **Расстройство желудочно – кишечного тракта:** - увеличение печени и селезенки, диспепсические расстройства

Профилактика анемии

- строго соблюдать режим дня
- рациональное витаминизированное питание
- профилактика рахита
- профилактика о.и. заболеваний
- **Роль воспитателя:**

  Если у ребенка в течение нескольких дней наблюдается снижение аппетита, раздражительность, необходимо сообщить об этом врачу

Гемофилия

ПОНЯТИЕ: Наследственная болезнь, передаётся от матери к сыну, характеризуется повышенной кровоточивостью из-за недостатка факторов свертывания крови

- **Страдают только мужчины, хотя дефектный ген передается всегда от матери больного**
- **Проявляется сразу после рождения**

- **Причины:** -внутриутробные мутации
  - наследственность
- **Симптомы**:
  - длительные кровотечения, возникающие даже при механических повреждениях(укус комара вызывает обильное кровотечение)
  - кровотечения из слизистых оболочек носа, легких, желудка, кишечника, мочевого пузыря.
  - кровоизлияния под кожу с образованием синяков или гематом
  - кровоизлияние в суставы с развитием их воспаления (отечные, болезненные, покрасневшие, движения ограничены, горячие на ощупь).
  - при кровоизлияниях в кишечнике, м.б. кишечная непроходимость
  - время свертываемости крови увеличено
- **Течение болезни:** периодическое, т.е. периоды кровоточивости сменяются периодами относительного благополучия

Лечение: - переливание крови
- применение антигемофильной плазмы
- антигемофильного гаммаглобулина

Очень полезны орехи, арахис до 50 – 100 г. в день, т.к. они богаты эпсилонамино-капроновой кислотой, способствующей повышению свертываемости крови

Профилактика:
-оберегать детей от травм
- диспансерное наблюдение

Первая помощь при кровотечении:
- холод на место ушиба
- внутрь раствор соли 1ч.л. на 100 г. воды
-адреналин
- гемофобин

СПИД – это последняя стадия ВИЧ-инфекции, когда защитная система организма разрушена. Заболевания, которые человек преодолевает в обычной жизни (*например, грипп или воспаление лёгких*), могут стать роковыми для людей, у которых СПИД.



СПИД И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА

Убить вирус можно нагреванием кровеносной системы до + 56° С в течение 50 минут. Так как эту процедуру не сможет выдержать ни один человек, можно говорить о том, что вылечить это заболевание невозможно. Кстати, выявить болезнь тоже очень сложно. Она долгое время может себя не проявлять, а обнаружить ее можно только в лабораторных условиях по специальной методике.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!