

ПРОФИЛАКТИКА ЭПИЛЕПСИИ

Работу выполнила
Студентка 106 группы
Педиатрического факультета ТГМУ
Славнова Анастасия Викторовна



- Эпилепсия (в переводе с древнегреческого - «схватывание») известна с древнейших времен. Этому заболеванию приписывали магическую природу и называли священным. Считалось, что таким образом боги наказывают тех, кто ведет несправедливый образ жизни. Внезапно начинающиеся припадки производили жуткое впечатление на окружающих, так как никто не мог объяснить причины «падучей».



ЭПИЛЕПСИЯ

- Эпилепсия- хроническое психоневрологическое заболевание, характеризующееся склонностью к повторяющимся внезапным припадкам. Припадки бывают различных типов, но в основе любого из них лежит аномальная и очень высокая электрическая активность нервных клеток головного мозга, вследствие которой возникает разряд.



Классификация эпилепсии

Эпилепсия

Первичная (идиопатическая)

Вторичная (симптоматическая)

Эпилептические припадки

Генерализованные (общие)

Парциальные (Фокальные, очаговые)

I. Большие судорожные припадки - наиболее частое проявление эпилепсии.


II. Малые припадки - проявляются кратковременным расстройством

I. Двигательные
II. Чувствительные
III. Психические
IV. Вегетативно-висцеральные
V. Полиморфные



- Для предотвращения симптоматической эпилепсии следует снизить риск любой патологии центральной нервной системы.
- **Меры профилактики симптоматических форм эпилепсии меняются в зависимости от возраста.**

Эпилепсия – судорожные припадки из-за расстройства электрических ритмов нейронов мозга



В ПЕРИОД ПЛАНИРОВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВАЖНЫ ТАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

- наблюдение у гинеколога с проведением диагностических методов обследования на выявление инфекций, способных оказывать повреждающее воздействие на плод (цитомегаловирусная инфекция, вирусы простого герпеса, токсоплазмоза, вируса краснухи и других инфекций);
- выявление и лечение этих инфекций;
- исключение других факторов риска (токсических — работа на вредном производстве, табакокурение и других интоксикаций; стрессовых факторов — актуально исключение хронической стрессовой ситуации в семье; нормализация отношений в коллективе и другие);
- здоровое питание;
- адекватные физические нагрузки, достаточная двигательная активность;
- лечение у матери хронических заболеваний и очагов хронической инфекции (синуситы, хронический пиелонефрит, паразитозы и другие).






• В период беременности требуется:


- с ранних сроков динамическое наблюдение у акушера — гинеколога и выполнение всех рекомендаций врача,
- профилактика и лечение гестоза, хронической фетоплацентарной недостаточности, угрозы выкидыша, метаболических нарушений, анемии.



В ПЕРИОД РОДОВ КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ РОДОВСПОМОЖЕНИЕ.



- В ранний возрастной период детства актуальны профилактика инфекций, в том числе нейроинфекций (менингитов, энцефалитов), черепно-мозговых травм.



Менингит


Воспаление или отек тонких мозговых оболочек, окружающих головной или спинной мозг

Энцефалит

Воспаление головного мозга

Воспаление, характерные для менингита и энцефалита

- **У взрослых** — профилактика сосудистых кризов (инсультов головного мозга), а также соматических заболеваний.



- При идиопатических формах эпилепсии предотвратить дебют приступов почти невозможно. Но при этих формах следует говорить о вторичной профилактике. Это профилактика самих приступов при эпилепсии.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРИСТУПЕ ЭПИЛЕПСИИ

Цель первой помощи при приступе – предотвратить причинение вреда здоровью человека, с которым случился приступ

ПРИЗНАКИ ПРИСТУПА:

- Судорожные сокращения мышц, «дрыгание» руками и ногами
- Остановка дыхания
- Потеря сознания, иногда с криком
- Запрокидывание головы
- Расширенные зрачки, «стеклянные» глаза




ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ:

Приступ с остановкой дыхания может длиться несколько минут

Если у пострадавшего есть лекарства, использовать их можно только по его личной просьбе. В ином случае вам может грозить уголовная ответственность за причинение вреда здоровью

У некоторых людей приступы случаются несколько раз в день



Очаг эпилептической активности в коре головного мозга

МЕРЫ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЭПИЛЕПСИИ СОСТОЯТ В

- регулярном непрерывном длительном приёме антиконвульсантов в индивидуально подобранной дозе, не меняя на дженерики;
- проведение контроля за лечением (электроэнцефалографии, контроля концентрации противоэпилептического препарата в крови);

Дженерик – это полноценный дубликат оригинала, с полным сохранением всех качеств и эффективности действия оригинала.




- соблюдении режима сна и бодрствования;
- исключении алкоголя у подростков и взрослых;
- если у пациента с эпилепсией выявлена фотосенситивность по ЭЭГ, то в избегании мелькания света, ограничении просмотра телепередач и занятий на компьютере, ношении солнцезащитных очков;
- при рефлекторных формах эпилепсии в исключении воздействия факторов, провоцирующих эпилептические приступы;
- в профилактике нервных перегрузок и стресса. Статистически достоверных доказательств факта провокации стрессом эпилептических приступов нет. Однако в жизни мы видим, что сильные эмоции гнева и страха провоцируют приступы. Значит, для профилактики эпилепсии и стресс нужно избегать.
- Для предотвращения приступа необходимо обязательно правильно питаться. В день можно выпивать не больше 2 л воды. Острую, соленую пищу следует ограничить, иначе из-за задержки воды ткани головного мозга будут отекать, что чревато развитием припадка.



У пациентов без приступов бывают случаи выявления на электроэнцефалограмме каких-то изменений:

- эпилептиформность по ЭЭГ
- снижение порога судорожной готовности; ирритативные изменения;
- дисфункция срединных структур;
- наличие элементов эпилептиформной активности;
- наличие особого электроэнцефалографического феномена «доброкачественных эпилептиформных разрядов детства» и некоторых других.



ЭПИЛепТИФОРМНОСТЬ ПО
ЭЭГ

Таким пациентам требуется консультация эпилептолога, чтобы разобраться, что представляют из себя эти изменения на ЭЭГ, каков их прогноз, дать рекомендации.



- Таким образом, профилактика симптоматической эпилепсии складывается из профилактики любой патологии центральной нервной системы, начиная с периода планирования беременности, в период течения беременности, родах, в детском и взрослом возрастах. У больных идиопатическими формами эпилепсии актуальна только вторичная профилактика — снижение риска возобновления приступов. Для этого требуется избегать факторов, которые провоцируют приступы, принимать индивидуально подобранную эпилептологом противоэпилептическую терапию, строго соблюдая рекомендации врача.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

