


• Эпилепсия (в переводе с древнегреческого - «схватывание») известна с древнейших времен. Этому заболеванию приписывали магическую природу и называли священным. Считалось, что таким образом боги наказывают тех, кто ведет неправедный образ жизни. Внезапно начинающиеся припадки производили жуткое впечатление на окружающих, так как никто не мог

объяснить причины «падучей».



## ЭПИЛЕПСИЯ

• Эпилепсия- хроническое заболевание, характеризующееся склонностью к повторяющимся внезапным припадкам. Припадки бывают различных типов, но в основе любого из них лежит аномальная и очень высокая электрическая активность нервных клеток головного мозга, вследствие которой возникает разряд.




### Классификация эпилепсии





- Для предотвращения симптоматической эпилепсии следует снизить риск любой патологии центральной нервной системы.
- Меры профилактики симптоматических форм эпилепсии меняются в зависимости от возраста.



## В ПЕРИОД ПЛАНИРОВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВАЖНЫ ТАКИЕ

- наблюдение у гинеколога с проведением диагностических методов обследования на выявление инфекций, способных оказывать повреждающее воздействие на плод (цитомегаловирусная инфекция, вирусы простого герпеса, токсоплазмоза, вируса краснухи и других инфекций);
- выявление и лечение этих инфекций;
- исключение других факторов риска (токсических работа на вредном производстве, табакокурение и других интоксикаций; стрессовых факторов актуально исключение хронической стрессовой ситуации в семье; нормализация отношений в коллективе и другие);
- здоровое питание;
- адекватные физические нагрузки, достаточная двигательная активность;
- лечение у матери хронических заболеваний и очагов хронической инфекции (синуситы, хронический пиелонефрит, паразитозы и другие).

#### МЕРОПРИЯТИЯ:





# • В период беременности требуется:


- о с ранних сроков динамическое наблюдение у акушера гинеколога и выполнение всех рекомендаций врача,
- профилактика и лечение гестоза, хронической фетоплацентарной недостаточности, угрозы выкидыша, метаболических нарушений, анемии.



## В ПЕРИОД РОДОВ КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ РОДОВСПОМОЖЕНИЕ.








#### • В ранний возрастной период

**детства** актуальны профилактика инфекций, в том числе нейроинфекций (менингитов, энцефалитов), черепно-мозговых травм.




#### Менингит


Воспаление или отек тонких мозговых оболочек, окружающих головной или спинной мозг

Энцефалит Воспаление головного

воспаление головного мозга



Воспаление, характерные для менингита и энцефалита •У взрослых — профилактика сосудистых кризов (инсультов головного мозга), а также соматических заболеваний.



• При идиопатических формах эпилепсии предотвратить дебют приступов почти невозможно. Но при этих формах следует говорить о вторичной профилактике. Это профилактика самих приступов при эпилепсии.

#### ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРИСТУПЕ ЭПИЛЕПСИИ

Цель первой помощи при приступе – предотвратить причинение вреда здоровью человека, с которым случился приступ

#### ПРИЗНАКИ ПРИСТУПА

Судорожные сокращения мышц, «дрыгание» руками и ногами


Остановка дыхания потеря сознания, иногда с криком головы

Расширенные зрачки, «стеклянные» глаза потеря сознания, иногда с криком головы

Остановка дыхания потеря с по

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ: КОЙ ДЫХЯНИЯ МОЖЕТ ДЛИТЬСЯ НЕСКОЛЬКО МИНУТ

Если у пострадавшего есть лекарства, использовать их можно только по его личной просьбе. В ином случае вам может грозить уголовная ответственность за причинение вреда здоровью У некоторых людей приступы случаются несколько раз в день




Очаг эпилептической активности в коре головного мозга

# МЕРЫ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЭПИЛЕПСИИ СОСТОЯТ В


- регулярном непрерывном длительном приёме антиконвульсантов в индивидуально подобранной дозе, не меняя на дженерики;
- проведение контроля за лечением (электроэнцефалографии, контроля концентрации противоэпилептического препарата в крови);

**Дженерик** - это полноценный дубликат оригинала, с полным сохранением всех качеств и эффективности действия оригинала.









У пациентов без приступов бывают случаи выявления на электроэнцефалограмме каких - то изменений:

- эпиактивность по ЭЭГ
- снижение порога судорожной готовности; ирритативные изменения;
- дисфункция срединных структур;
- наличие элементов эпилептиформной активности;
- наличие особого электроэнцефалографического феномена «доброкачественных эпилептиформных разрядов детства» и некоторых других.

Таким пациентам требуется консультация эпилептолога, чтобы разобраться, что представляют из себя эти изменения на ЭЭГ, каков их прогноз, дать рекомендации.



• Таким образом, профилактика симптоматической эпилепсии складывается из профилактики любой патологии центральной нервной системы, начиная с периода планирования беременности, в период течения беременности, родах, в детском и взрослом возрастах. У больных идиопатическими формами эпилепсии актуальна только вторичная профилактика — снижение риска возобновления приступов. Для этого требуется избегать факторов, которые провоцируют приступы, принимать индивидуально подобранную эпилептологом противоэпилептическую терапию, строго соблюдая рекомендации врача.

#### СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

