

Антибактериальные,
противовирусные, противогрибковые
и противовоспалительные
препараты применяемые при
воспалительных заболеваниях
органов малого таза у женщин
применяемые согласно клинических
протоколов МЗРК.

Сальпингит и сальпингоофорит

- Схема №1





Схема №2



Бартолинит

- 1 линия препаратов



2 линия препаратов



Бактериальный вагиноз

- 1 линия





2 линия



Трихомонадный вагинит/ вульвит



Кандидозный вагинит / вульвит



Содержит 1000 г мази. Состав: нистатин — 0,2000 г. Нистатин (полиеновый АС) — 1000 г. Вспомогательные вещества: вазелин — 2000 г. Спирт — 1000 г. Жидкость в форме, соответствующая по вязкости при температуре хранения мази. Срок годности мази — 24 месяца. Условия хранения: хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Соблюдать осторожность при применении. Срок годности мази — 24 месяца. Условия хранения: хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Соблюдать осторожность при применении. ЛСР-008634/08 от 30.10.2008 г.



Противогрибковое средство

НИСТАТИН

мазь для наружного применения
100 000 ЕД/г

30 г



 **биосинтез**

Эндометрит





phs Фармстандарт

Метронидазол

20 таблеток по 0,25 г



4601669002198



- Гормоны:

Перитонит

- Предоперационная подготовка







Терапия послеоперационного периода





Противогрибковая терапия



Сепсис

- Инфузионно – трансфузионная терапия:



