

Антибактериальные,
противовирусные, противогрибковые
и противовоспалительные
препараты применяемые при
воспалительных заболеваниях
органов малого таза у женщин
применяемые согласно клинических
протоколов МЗРК.

Сальпингит и сальпингоофорит

- Схема №1




Схема №2



Бартолинит

- 1 линия препаратов



2 линия препаратов





2 линия



Трихомонадный вагинит/ вульвит



Кандидозный вагинит / вульвит



Содержит 100 г мази. Состав: нистатин - 0,200 г. Нистатин (полиеновый АН) г.
вещество - 200 000 ЕД. Соединение в форме нистатината. Состав: нистатин (полиеновый АН) г.
мазь для наружного применения. Состав: нистатин (полиеновый АН) г. Состав: нистатин (полиеновый АН) г.
для наружного применения. Состав: нистатин (полиеновый АН) г. Состав: нистатин (полиеновый АН) г.
ЛСР-008634/08 от 30.10.2008 г.



Противогрибковое средство

НИСТАТИН

мазь для наружного применения
100 000 ЕД/г

30 г



 биосинтез





OJSC Pharmstandard

Метронидазол

20 таблеток по 0,25 г




4 601669 002198




- Гормоны:

Перитонит

- Предоперационная подготовка







Терапия послеоперационного периода





Противогрибковая терапия



