

# ДТЗ (болезнь Грейвса-Базедова)

1.

## Поражение сердечно-сосудистой системы

1.1.1 Постоянная синусовая тахикардия.

1.1.2 Постоянная мерцательная тахикардия.

1.1.3 Пароксизмы мерц. тахиаритмии на фоне син.

1.1.4 Пароксизмы мерц. тахиар. на фоне норм. син.  
экстрасистолия.

1.2 Высокое пульсовое давление

1.3 НК вследствие развития дисгармональной миокардиодистрофии.

## 2. Поражение периферической и центральной нервной системы.

2.1 Повышенная возбудимость и быстрая утомляемость.

2.2 Плаксивость.

2.3 Расстройство сна.

2.4 Тремор тела (синдром «телеграфного столба») и

особенно пальцев рук (синдром Мерк)

- 1.1 Повышенная потливость.
  - 1.2 Стойкий красный дермографизм.
  - 1.3 Повышение сухожильных рефлексов.
  - 1.4 Глазные симптомы тиреотоксикоза (Грефе, Кохера, Дальримпля, Мебиуса, Жофруа, Боткина и т.д.).
3. Синдром катаболических нарушений
    - 3.1 Похудание на фоне повышенного аппетита.
    - 3.2 Субфебрильная температура тела.
    - 3.3 Мышечная слабость.
    - 3.4 Тиреогенный остеопороз.
4. Синдром эктодермальных нарушений.
    - 4.1 Расслаивание и повышенная ломкость ногтей (ноготь Пламмера).
    - 3.2 Ломкость и выпадение волос.

5.

**Поражение желудочно-кишечного тракта (гиперсекреция, гипердефекация).**

**5.2 Неустойчивый частый стул (до 10 раз в сутки).**

**Нарушение функции печени вплоть до цирроза.**

6. **Поражение других желез внутренней секреции**

**6.1**

**6.2 Развитие недостаточности надпочечников.**

**Дисфункция яичников.**  
**6.1.1 Нарушение менструального цикла вплоть до аменореи.**

**6.1.2 Невынашивание беременности.**

**6.3**

**Поражение молочных и грудных желез.**  
**6.1.3 Фиброзно-кистозная мастопатия.**

**6.1.4 Гинекомастия у мужчин.**

**6.4**

**Нарушение толерантности к углеводам, развитие сахарного диабета.**

## Глазные симптомы.

- 1. Симптом Грефе** - **верх-**  
него века от радужной оболочки при фиксации  
зрением медленно перемещающегося вниз предмета,  
в связи с чем между верхним веком и радужной  
оболочкой остается белая полоска склеры.
- 2. Симптом Кохера** -  
верхним веком и радужной оболочкой при движении и  
при движении глазного яблока вверх.
- 3. Симптом Мебиуса**  
конвергенции, т.е. **характерно вти фиксировать**  
предметы на близком расстоянии из-за преобладания  
тонуса косых мышц над тонусом конвергирующих  
внутренних прямых мышц.
- 4. Симптом Штельвага** –  
минуту) и неполное **выражение (при расщеплении 6-8 раз как**  
проявление понижения чувствительности роговицы.

5. **Симптом Дельримпля** – обнажением полоски шириной 2 мм радужной оболочкой глазных щелей, обусловлено парезом круговой мышцы век, иннервируемой лицевым нервом.
6. **Симптом Еллинека** – гиперпигментация кожи век, рассматривают как одно из проявлений надпочечниковой недостаточности.
7. **Симптом Розенбаха** – тремор закрытых век.
8. **Симптом Жоффруа (Блиной)** – наступает сморщивания лба. при взгляде вверх не
9. **Симптом Боткина** – расширение
10. **Симптом Крауса** –
11. **Симптом Мари** – ускоренный блеск глаз.  
« тела (синдром