

# **Современные протоколы и практика терапии печеночной недостаточности**

**Есмамбетов Кахарман Избасарович, к.м.н.**

Главный внештатный гепатолог/гастроэнтеролог УОЗ г. Астаны

**2018**

# Печеночная недостаточность – диагностика (1)

*Насколько правомочен диагноз острой печеночной недостаточности?*

## Случай №1

Пациентка 32 года

- Аутоиммунный гепатит
- АЛТ 830, АСТ 910, билирубин 265/180, МНО 1.2
- Печеночная энцефалопатия 0-1 ст
- Минимальная портальная гипертензия

## Случай №2

Пациент 48 лет

- Без печеночного анамнеза, после ОРВИ
- АЛТ 410, АСТ 735, билирубин 165/110, МНО 1.7
- Печеночная энцефалопатия 1-2 ст
- Без портальной гипертензии

## Случай №3

Пациент 19 лет

- Кровотечение из ВРВП (4-е за 2 года), кавернозная трансформация воротной вены
- АЛТ 55, АСТ 42, билирубин 24/16, МНО 1.1
- Печеночная энцефалопатия 0-1 ст
- Выраженная портальная гипертензия: асцит, гидроторакс, гиперспленомегалия, PLT 55

## Печеночная недостаточность – диагностика (2)

недель с развития желтухи до дебюта печеночной энцефалопатии



**Острая печеночная недостаточность –**  
повышение МНО > 1.5 и печеночная энцефалопатия,  
развившееся в течение последних 26 недель у пациентов с  
отсутствием заболевания печени в анамнезе

# Печеночная недостаточность – диагностика (3)

*Насколько правомочен диагноз печеночной недостаточности?*

Случай №1

Пациентка 32 года

- Аутоиммунный гепатит
- АЛТ 830, АСТ 910, билирубин 265/180, МНО 1.2
- Печеночная энцефалопатия 0-1 ст
- Минимальная портальная гипертензия

Случай №2

Пациент 48 лет

- **Без печеночного анамнеза, после ОРВИ**
- АЛТ 410, АСТ 735, билирубин 165/110, МНО 1.7
- **Печеночная энцефалопатия 1-2 ст**
- Без портальной гипертензии

Случай №3

Пациент 19 лет

- Кровотечение из ВРВП (4-е за 2 года), кавернозная трансформация воротной вены
- АЛТ 55, АСТ 42, билирубин 24/16, МНО 1.1
- Печеночная энцефалопатия 0-1 ст
- Выраженная портальная гипертензия: асцит, гидроторакс, гипертрофия селезенки, спленомегалия,

**Острая печеночная недостаточность  
(acute liver failure)**

# Острая или хроническая печеночная недостаточность?

## Случай №1

Пациентка 32 года

- Впервые кровотечение из ВРВП, выраженный асцит
- Цирроз печени – HBV+D
- АЛТ 110, АСТ 195, билирубин 385/210, креатинин 80, МНО 1.4
- Печеночная энцефалопатия 0-1 ст
- Умеренная портальная гипертензия

## Случай №2

Пациент 48 лет

- Без печеночного анамнеза, после ОРВИ
- АЛТ 410, АСТ 735, билирубин 165/110, креатинин 60, МНО 1.7
- Печеночная энцефалопатия 1-2 ст
- Без портальной гипертензии

## Случай №3

Пациент 61 год

- Печеночная энцефалопатия 3 ст
- Цирроз печени - HCV
- АЛТ 45, АСТ 130, билирубин 270/155, креатинин 240, МНО 2.1
- САД 68 мм ртст
- PaO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub> 250
- Умеренная портальная гипертензия: ВРВП 1, асцит



**Острая  
печеночная  
недостаточность**



*Хроническая печеночная недостаточность?*



# Печеночная недостаточность

## Обострение с прогрессированием хронической печеночной недостаточности (acute on chronic liver failure) -

характеризуется полиорганной недостаточностью и неблагоприятным прогнозом

Степень ACLF	Критерии	Летальность 28 дней (%)
ACLF – 0	<ul style="list-style-type: none"><li>- Отсутствие недостаточности систем или</li><li>- Недостаточность 1 системы (печень/свертываемость/ СС/легкие) + креатинин &lt; 1.5N + отсутствие ПЭ или</li><li>- ПЭ + креатинин &lt; 1.5N</li></ul>	4.7
ACLF – 1	<ul style="list-style-type: none"><li>- Почечная недостаточность</li><li>- Недостаточность 1 системы (печень/свертываемость/ СС/легкие) + креатинин 1.5N-1.9N и/или ПЭ 1-2 ст</li><li>- ПЭ + креатинин 1.5N-1.9N</li></ul>	22.1
ACLF – 2	Недостаточность 2 систем	32.0
ACLF - 3	Недостаточность $\geq 3$ систем	78.6

Moreau Gastroenterology 2013

# Острая или хроническая печеночная недостаточность?

## Случай №1

Пациентка 32 года

- Кровотечение из ВРВП, выраженный асцит
- Цирроз печени – HBV+D
- АЛТ 110, АСТ 195, билирубин 385/210, креатинин 80, МНО 1.4
- Печеночная энцефалопатия 0-1 ст
- Умеренная портальная гипертензия

Декомпенсация ЦП

## Случай №2

Пациент 48 лет

- Без печеночного анамнеза, после ОРВИ
- АЛТ 410, АСТ 735, билирубин 165/110, креатинин 60, МНО 1.7
- Печеночная энцефалопатия 1-2 ст
- Без портальной гипертензии

Острая печеночная недостаточность

## Случай №3

Пациент 61 год

- Печеночная энцефалопатия 3 ст
- Цирроз печени - HCV
- АЛТ 45, АСТ 130, билирубин 270/155, креатинин 240, МНО 2.1
- САД 68 мм ртст
- PaO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub> 250
- Умеренная портальная гипертензия: ВРВП 1, асцит

ACLF


- **Трансплантация печени**
- **Патогенетическая/симптоматическая терапия полиорганной недостаточности (СС и почечной)**
- **Заместительная печеночная терапия (MARS, Prometheus и др.)**
- **Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор**
- **Пересадка мезенхимальных стволовых клеток**
- **Другие (плазмаферез и т.д.)**



- Крайне мало клинических исследований
- Адекватный подбор пациентов затруднителен
- Сложность ведения пациентов с полиорганной недостаточностью
- Крайне высокая летальность в листе ожидания
- Необходимость клинических исследований, основанных на intention-to-treat

## Терапия ACLF – трансплантация печени (2)


Моноцентровое ретроспективное когортное исследование реципиентов печени (n=332): средний MELD без ACLF – 21.3, с ACLF 28.8, 34 комбинированных пересадок (10 с ACLF), 21% летальность, 7.5% ретрансплантация



- Выведение провоспалительных молекул
- Нормализация функции альбумина
- Нормализация циркуляторной дисфункции
- Улучшение печеночной энцефалопатии
- Стабилизация/улучшение функции почек


## Заместительная печеночная терапия (2)

Многоцентровое рандомизированное исследование пациентов с ACLF (n=145): 8-11 сеансов Prometheus (не менее 3 ч) в течение 3 недель



# Заместительная печеночная терапия (3)

Многоцентровое рандомизированное исследование пациентов с ACLF (n=145):  
8-11 сеансов Prometheus (не менее 3 ч) в течение 3 недель




- Гетерогенность пациентов
- Недостаток консенсуса по критериям ACLF
- Запоздавая инициация терапии у многих пациентов
- Отсутствие биомаркеров для навигации лечения
- Отсутствие возможности подбора адекватной “терапевтической дозы” лечения
- “Ложно-отрицательные” результаты некоторых клинических исследований?

- **Возможность улучшения регенерации гепатоцитов**
- **Коррекция нарушения функции нейтрофилов при ACLF**
- **Лечение бактериальных инфекций, часто сопутствующих ACLF**
- **Индукцирует мобилизацию клеток-предшественников в костном мозге**
- **Повышает количество нейтрофилов**
- **Повышает пролиферацию гепатоцитов в экспериментальных моделях ACLF**

# Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (2)

Моноцентровое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование  
G-CSF 5 мкг/кг (12 доз) у пациентов с ACLF (n=47) :

выживаемость 66%-26%, сепсис 14%-41%, ГПС 19%-71%, ПЭ 19%-66%



Количество пациентов

Дни	0	7	14	30	60
G-CSF	23	22	22	18	16
Плацебо	24	21	17	11	7

Garg Gastroenterology 2012



# **Трансплантация мезенхимальных стволовых клеток (МСК)**

---

- **Концентрация в эпицентре воспаления**
- **Паракринное воздействие в зоне воспаления (на другие клетки)**
- **Смещение продукции цитокинов от про- к противовоспалительным**
- **Модуляция иммунного ответа, функции Т-клеток**
- **Ингибирование Т-киллеров путем модуляции иммунного ответа**
- **Трансплантация МСК уменьшает повреждение печени вследствие сепсиса**
- **Инфузия МСК останавливает острую печеночную недостаточность в экспериментальных моделях**
- **Трансплантация аутологичных клеток костного мозга уменьшает прогрессирование фиброза печени**

# Выводы

---

- **Диагностика печеночной недостаточности:**
  - острая печеночная недостаточность
  - декомпенсация цирроза печени
  - острое прогрессирование хронической печеночной недостаточности (ACLF)
- **Прогноз ACLF определяется степенью полиорганного поражения**
- **Акцент лечения на компенсацию циркуляторной и почечной недостаточности**
- **Трансплантация печени**
- **Роль заместительной печеночной терапии возможно недооценена**
- **Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор**