



Кафедра: *Стоматология бойынша интернатура және
резидентура*
ИӨЖ

Тіл-жұтқынышақ нервiнiң невралгиясы. Нақтамасы

Тексерген: Айтбаев Ж.Ж.

Орындаған: Зәуірбекқызы А.

Факультет : стоматология

Тобы: 604-01

Жоспары:

I. Кіріспе

II. Негізгі бөлім


- Тіл жұтқыншақ невралгиясының белгілері
- Аурудың пайда болу себебі
- Диагностикасы
- Емі

III. Қорытынды


IV. Әдебиет тізімі


Тіл жұтқыншақ нерві

- Тілжұтқыншақ нерві - (лат. nervus glossopharyngeus) бассүйек нервтерінің IX жұп нерві. Аралас нерв болып табылады. Қызметі:
- Жұтқыншақты көтеретін бұлшықетті қозғалтқыш иннервациялайды
- Құлақмаңы безін иннервациялап, секрет бөлуіне қатысады
- Тілдің артқы 1/3 дәм сезуі



Языкоглоточный нерв N. glossopharyngeus





Тілжұтқыншақ нервiнiң невралгиясы – көптеген тiтiркендiргiш факторлардың әсерiнен болады. Ең алғаш рет бұл ауруға 1920 жылы Сикар сипаттама берген. Бұл аурудың симптомдары үшкiл нерв невралгиясына өте ұқсас болғанымен, үшкiл нерв невралгиясына қарағанда 100 есе жиi кездеседi.

ЭТИОЛОГИЯСЫ

- Нервке жақын орналасқан ісіктер
- Нервтің басылып қалуы
- Жиі инфекциялық зақымданулар
- Бассүйектегі мойындырық тесіктің тар болуы
- Тіластылық байламдардың өзгерістері
- Қан тамырларының патологиялары

Тілжұтқыншақ нерв невралгиясының көріністері

Бұл ауру 30-40 жастан кейін көріне бастайды. Әйел адамдарда ер адамдарға қарағанда 2 есе жиі кездеседі. Олар тіл түбіріндегі немесе бадамшалардың маңындағы қатты ауру сезіміне шағымданады. Бұл ауру сезімдері құлаққа, тамаққа, таңдайға, төменгі жақтың бұрыштарына таралады. Бұл кезде сілекей көп бөлінеді, бетінің қызаруы, жөтел, пульстің төмендеуі, бұлшықееттік әлсіздік, адам талып қалуы да мүмкін.




Ауру сезімі әдетте пароксизмальды болады, 2 минутқа дейін созылады. Кейде науқастар ауру сезімін тудыратын орындарды өздері байқайды. Себебі ол орындарға жанасқан уақытта науқаста ұстама басталуы мүмкін. Көбіне ол аймақтар тіл бадамшаларда болуы мүмкін.



Ауру сезімінің пайда болу себептері:

- Ас жұтқан кезде
- Сілекей жұтқан кезде
- Сөйлеген кезде



Бұл ауру көбіне күз-қыс
кездерінде болады.





Тілжұтқыншақ нерві невралгиясы диагнозын қою үшін мына симптомдар болу керек:

- Ауру локализациясы, яғни ауру сезімі тілжұтқыншақ нервтің иннервациялайтын орындарында болуы
- Ауру сезімі пароксизмальді болуы
- Басқа аймақтарға аурудың иррадиациясы
- Төменгі жақтың бұрыштарында ауру сезімі болуы

Тілжұтқыншақ нервінің дифференциалды диагностикасы ең алдымен үшкіл нерв невралгиясымен жүргізіледі. Екі невралгияның айырмашылықтары ауру сезімінің локализациясы, науқас жасы және триггерлі орындарында болады.



Диагностикасы



Тілжұтқыншақ нервiнiң невралгиясын анықтау мақсатында ортопантомограмма қоладнылады. Ол өсiндiнiң, байламдардың ұлғайғанын анықтайды. Сонымен қатар бас миының компьютерлi томографиясы, қантамырлардың магниттi-резонансты томографиясын жасайды. Мiндеттi түрде дәрігер-онкологпен консультация жүргiзу керек. Электронеуромиографияны қолданады.

Емі

Негізінен
невралгиясы
медикаментозды
емделеді. Көбіне:
спазмолитиктер,
препараттар, нейролептиктер,
тілжұтқыншақ
консервативті
препараттармен
анальгетиктер,
ұстамаға
қарсы
нерві
түрде
жергілікті



Қолданылған әдебиеттер:

- <http://inmedclinica.ru/content/nevropatiya>
- <http://medactiv.ru/yneuro/guide-0337.shtml>
- http://polbu.ru/nervous_disease/ch13_all.html



НАЗАРЛАРЫҢЫЗГА
РАХИМЕТ!