

# Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху та одиниці швидкості.

Фізика 7 клас  
Урок 10

# Перевірка домашнього завдання

- *Футболіст пробігає за матч близько 10км. 10км — це шлях чи модуль переміщення футболіста? Яким може виявитися мінімальний модуль переміщення футболіста за матч?*



# Перевірка домашнього завдання

- *Пасажир потяга пройшов вагоном від першого до четвертого купе. За цей час вагон проїхав відстань 400 м. Відстань між першим і четвертим купе становить 7,5 м. Визначте, який шлях подолав пасажир відносно потяга; відносно землі, якщо пасажир рухався:*
  - *в напрямку руху потяга;*
  - *в напрямку, протилежному напрямку руху потяга.*


# Що таке рівномірний рух?

- **Рівномірний рух** — це механічний рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло долає однаковий шлях.

# Рівномірний прямолінійний рух

- **Рівномірний прямолінійний рух** — це механічний рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло здійснює однакові переміщення.

# Швидкість рівномірного руху



**Рис. 8.1.** Автомобіль, який рухається рівномірно прямолінійно, за будь-які рівні інтервали часу здійснює однакові переміщення

# Швидкість рівномірного руху


- **Швидкість рівномірного руху ( $v$ )** — це фізична величина, що дорівнює відношенню шляху  $l$ , який пододало тіло, до інтервалу часу  $t$ , протягом якого цей шлях був подоланий:

$$v = \frac{l}{t}$$


$$v = \frac{s}{t} \text{ або } v = \frac{l}{t}, \quad [v] = \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

# Характеристики швидкості

- Швидкість руху — векторна величина



**Рис. 8.1.** Автомобіль, який рухається рівномірно прямолінійно, за будь-які рівні інтервали часу здійснює однакові переміщення




**Рис. 8.2.** У ході криволінійного руху напрямок швидкості руху весь час змінюється



# Характеристики швидкості

- Напрямок і значення швидкості руху залежать від того, відносно якого тіла розглядають рух.



**Рис. 8.3.** Напрямок і значення швидкості руху залежать від того, де перебуває спостерігач

# Перетворення одиниць швидкості

- Швидкість руху автомобіля — 36 км/год.  
Щоб подати її в метрах за секунду,  
згадаємо, що 1 год = 3600 с, а 1 км = 1000 м.  
Тоді:

$$36 \frac{\text{км}}{\text{год}} = \frac{36 \text{ км}}{1 \text{ год}} = \frac{36 \cdot 1000 \text{ м}}{3600 \text{ с}} = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$


# Перетворення одиниць швидкості

- Швидкість руху літака — 250 м/с. Подамо її в кілометрах на годину:

$$250 \frac{\text{м}}{\text{с}} = \frac{250 \text{ м}}{1 \text{ с}} = \frac{250 \cdot 0,001 \text{ км}}{\frac{1}{3600} \text{ год}} = 250 \cdot 0,001 \cdot 3600 \frac{\text{км}}{\text{год}} = 250 \cdot 3,6 \frac{\text{км}}{\text{год}} = 900 \frac{\text{км}}{\text{год}}$$

# Перетворення одиниць швидкості

м/с	км/год
5	18
10	36
15	54
20	72
25	90
30	108




**Рис. 8.4.** Схема переведення швидкості руху, поданої в метрах за секунду, у швидкість, подану в кілометрах за годину, і навпаки

# Визначаємо шлях і час руху тіла

$$v = \frac{l}{t}$$


$$l = v \cdot t$$

$$t = \frac{l}{v}$$



# Розв'язування задач

- Вважаючи рух плавців рівномірним, визначте швидкість руху кожного з них.



# Розв'язування задач

- *Подайте в метрах за секунду:  
18 км/год; 108 км/хв; 72 см/хв.*
- *Подайте в кілометрах за  
годину: 2 м/с; 30 км/хв; 20 см/с.*

# Розв'язування задач

- *В астрономії існує одиниця довжини світловий рік, яку застосовують для визначення міжзоряних відстаней. Один світловий рік дорівнює відстані, яку долає світло у вакуумі за 1 рік. Подайте цю відстань у кілометрах, вважаючи, що швидкість поширення світла у вакуумі дорівнює 300 000 км/с.*



# Домашнє завдання

- Вивчити: § 8
- Впр. 8 (1, 3) – письмово
- Впр. 8 (7) – додаткове завдання