

# Основы математической обработки информации

Семестр: 3

Лекции: 6

Практические занятия: 10

Контрольная работа: 1

Зачёт

# Лекция 2. Дискретные и непрерывные модели Апроксимация

**§1. Задача о размножении кроликов**

**Последовательности**

**§2. Задача о ступеньках из домино**

**Ряды**

**§3. Задача о площади сектора**

**Функции**

**§4. Задача об эксплуатации автомобиля**


**Апроксимация**

**§5. Математическое моделирование**

# §1. Задача о размножении кроликов



Леонáрдо Пизáнский  
1170-1250





## §1. Задача о размножении кроликов


В своей книге «*Liber Abaci*» (1202) Леонардо Пизанский, известный как Фибоначчи, рассматривает развитие идеализированной (биологически нереальной) популяции кроликов, предполагая, что:

- изначально есть новорожденная пара кроликов (самец и самка);
- со второго месяца после своего рождения кролики начинают спариваться,
- и каждый месяц производить новую пару кроликов;
- кролики никогда не умирают.

Сколько пар кроликов будет через  $n$  месяцев?



## §1. Задача о размножении кроликов





## §1. Задача о размножении кроликов

Обозначим через  $A$  пару зрелых кроликов, а через  $B$  – пару новорожденных кроликов. Тогда процесс «размножения» может быть описан с помощью двух «переходов»:

$A - AB$  моделирует ежемесячное превращение каждой зрелой пары кроликов  $A$  в две пары, а именно в ту же самую пару зрелых кроликов  $A$  и новорожденную пару кроликов  $B$ ;

$B - A$  моделирует процесс «созревания» кроликов, когда новорожденная пара кроликов  $B$  через месяц превращается в зрелую пару  $A$ .




## §1. Задача о размножении кроликов

Дата	Пары кроликов	A	B	A+B
1-го января	A	1	0	1
1-го февраля	AB	1	1	2
1-го марта	ABA	2	1	3
1-го апреля	ABAAB	3	2	5
1-го мая	ABAABABA	5	3	8
1-го июня	ABAABABAABAAB	8	5	13



## §1. Задача о размножении кроликов Последовательности

$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n, a_1 = a_2 = 1, n \in \mathbb{N}$$



# §1. Задача о размножении кроликов

## Последовательности

**Последовательность** – числовая функция  
натурального аргумента.

$$\{a_n \mid a_n = f(n), \forall n \in \mathbb{N}\}$$

### Способы задания последовательности

- описание;
- перечисление элементов;
- формула общего члена;
- рекуррентная формула;
- графический.

$$\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \boxtimes$$

# §1. Задача о размножении кроликов

## Последовательности

### Свойства последовательностей

- стационарность;
- цикличность;
- монотонность;
- ограниченность.

$$\frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{3}{7}, \frac{4}{9}, \frac{5}{11}, \dots$$

### Операции над последовательностями

- сложение;
- вычитание;
- умножение;
- деление;
- умножение на число.

# §1. Задача о размножении кроликов

## Последовательности

### Частные случаи последовательностей

- арифметическая прогрессия:  $a_{n+1} = a_n + d$   

$$a_n = \frac{a_{n+k} + a_{n-k}}{2}$$
- геометрическая прогрессия:  $b_{n+1} = b_n \cdot q, q \neq 0$   


$$b_n = \sqrt{b_{n+k} \cdot b_{n-k}}$$

### Предел последовательности

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \stackrel{\text{def}}{:=} \forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon), \forall n \geq N(\varepsilon) \Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon$$

$$\frac{2}{1}, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}, \frac{5}{4}, \frac{6}{5}, \dots \rightarrow 1$$

## §2. Задача о ступеньках из домино



Владимир Игоревич Арнольд  
12 июня 1937 — 3 июня 2010


В. И. Арнольд

### Задачи для детей от 5 до 15 лет

A small photograph showing a man in a white t-shirt and green pants sitting on some steps, interacting with a young child who is sitting on the floor next to him. Below the photograph is the logo for "Династия", which consists of a stylized tree or leaf design inside a square frame.




## §2. Задача о ступеньках из домино



16. Положив (нужным образом) друг на друга несколько одинаковых пластинок (например, костяшек домино), можно образовать навес длиной  $x$  костяшек. Каково наибольшее достижимое значение длины навеса  $x$ ?

## §2. Задача о ступеньках из домино



Пантаев  
Михаил Юрьевич



## §2. Задача о ступеньках из домино

**35** Пусть имеется неограниченный запас одинаковых кирпичей, которые кладутся друг на друга с некоторым сдвигом так, чтобы конструкция не падала. На какое наибольшее расстояние конец последнего кирпича может отстоять от начала первого (рис. 24)?




Рис. 25

В формулировке задачи содержится некий отвлекающий момент, препятствующий правильной догадке о том, что «крышу» можно сделать бесконечно длинной. В самом деле: если действительно класть кирпичи друг на друга, то, положив два со сдвигом  $1/2$  (считаем длину кирпича равной 1), мы увидим (рис. 25), что дальше-то некуда: если хоть немного сдвинуть 3-й кирпич относительно 2-го, пирамида рухнет.

Поступим иначе: станем подсовывать кирпичи друг под друга; тогда стратегия будет состоять в том, чтобы после добавления очередного кирпича центр тяжести всей конструкции проектировался в край нижнего кирпича.

Тогда второй кирпич по-прежнему можно сдвинуть относительно первого на  $1/2$ . Если  $O_1$  и  $O_2$  — центры тяжести кирпичей (рис. 26), то их общий центр тяжести находится в точке  $A$ , делящей отрезок  $MN$  пополам и отстояющей от края второго кирпича на  $1/4$ .




Рис. 26




Рис. 24

## §2. Задача о ступеньках из домино

### Ряды

Значит, третий кирпич можно сдвинуть относительно второго на  $1/4$ . Если  $O_3$  — центр тяжести третьего кирпича (рис. 27), то общий центр тяжести системы из трех кирпичей находится в точке  $B$ , такой что  $O_3B : BA = 2 : 1$  (правило рычага). Значит, точка  $B$  делит отрезок  $M_1N_1$  (равный половине длины кирпича) в отношении  $2:1$ ,

т. е.  $M_1B = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$ , тогда  $BN_1 = \frac{1}{6}$  и четвертый кир-

пич можно сдвинуть относительно третьего на  $1/6$ . Аналогично устанавливается, что для следующего центра имеем пропорцию  $O_4C : CB = 3 : 1$  и, значит, пятый кирпич можно сдвинуть на  $1/8$ , и т. д.

Тогда общий сдвиг составит величину  $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} +$

$+ \frac{1}{8} + \dots = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ , а поскольку ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  расходится, крыша может быть бесконечно длинной.




Рис. 27

## §2. Задача о ступеньках из домино **Ряды**

**Ряд – это бесконечная сумма.**

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

### **Виды рядов**

- **числовые ряды;**
  - **положительные;**
  - **знакопеременные;**
  - **знакоочередующиеся;**

$$\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

- **функциональные;**  $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 
  - **степенные;**
  - **тригонометрические;**
  - **...**


## §2. Задача о ступеньках из домино Ряды

### Вычисление (исследование) рядов

$$S = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$$

$$S_1, S_2, S_3, S_4, \dots \rightarrow S$$

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$$



$$S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots$$

$$S_2 = \frac{3}{2}, S_3 = \frac{7}{4}, S_4 = \frac{15}{8}, \dots, S_n = \frac{2^n - 1}{2^{n-1}} = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}, \dots \rightarrow 2$$

## §3. Задача о площади сектора функции



Мордкович  
Александр Григорьевич





## §3. Задача о площади сектора Функции




Рис. 6

- 7.4. На рисунке 6 изображен сектор круга, радиус которого равен 1, а центральный угол равен  $\varphi$ , причем  $\varphi \in (0; 2\pi)$ .
- Выразите площадь  $S$  этого сектора как функцию угла  $\varphi$ :  $S = S(\varphi)$ .  
 Постройте график функции  $S = S(\varphi)$ .
  - Вычислите значение функции  $S = S(\varphi)$  при  $\varphi = \frac{\pi}{3}$ .
  - Найдите  $S(2) - S(1)$ .
  - Найдите  $S(\varphi + \delta) - S(\varphi)$ .

## §3. Задача о площади сектора функции

**Числовой функцией** с областью определения  $D$  называется **зависимость**, при которой каждому числу из множества  $D$  ставится в соответствие единственное число  $y$ , обычно обозначаемое  $y=f(x)$ .<sup>1</sup>

### Способы задания функций

- описание;
- табличный;
- графический;
- аналитический.




Рис. 6

<sup>1</sup> Сравните с определением Лекции I (слайд 31).

## §3. Задача о площади сектора функции

### Свойства функций

- монотонность;
- ограниченность;
- чётность/нечётность;
- периодичность.




Рис. 6

### Операции над функциями

- сложение;
- вычитание;
- умножение;
- деление;
- умножение на число;
- суперпозиция.

## §3. Задача о площади сектора функции

### Основные элементарные функции


- линейная;
- квадратичная;
- степенная;
- показательная;
- логарифмическая;
- тригонометрические;
- обратные тригонометрические.

## §3. Задача о площади сектора функции

### Предел функции


$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \stackrel{\text{def}}{:=}$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists M > 0, \forall x \geq M \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$



$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \stackrel{\text{def}}{:=}$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0, \forall x : 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$



## §4. Задача об эксплуатации автомобиля Аппроксимация

В результате исследования зависимости между сроком эксплуатации автомобиля и расходами на его ремонт получены следующие данные:

$t$ , лет	1	2	3	4	5	6	7	8
$S$ , тыс. руб.	120	140	230	370	445	570	655	770

Составьте линейную зависимость стоимости ремонта от срока эксплуатации.

Определите предполагаемую величину затрат на ремонт на 10-й год эксплуатации.



## §4. Задача об эксплуатации автомобиля Апроксимация

**Апроксима́ция** (от лат. *proxima* – ближайшая) или **приближéние** — научный метод, состоящий в замене одних объектов другими, в каком-то смысле близкими к исходным, но более простыми.

Апроксимация позволяет исследовать числовые характеристики и качественные свойства объекта, сводя задачу к изучению более простых или более удобных объектов.

## §4. Задача об эксплуатации автомобиля Апроксимация

**Интерполя́ция      интерполи́рование** — в вычислительной математике способ нахождения промежуточных значений величины по имеющемуся дискретному набору известных значений.

**Экстраполи́ция, экстраполи́рование** — особый тип аппроксимации, при котором функция аппроксимируется вне заданного интервала, а не между заданными значениями.



## S4. Задача об эксплуатации автомобиля Апроксимация Метод наименьших квадратов

Этот метод применяется для согласования между собой слегка противоречащих друг другу данных эксперимента (измерений). Пусть измерены координаты  $x_1, x_2, \dots, x_n$  и  $y_1, y_2, \dots, y_n$   $n$  точек, которые — теоретически — должны лежать на одной прямой. Как выбрать прямую, которая наилучшим образом соответствует этим точкам?

Пусть  $y = ax + b$  — уравнение искомой прямой; вертикальное отклонение точки  $(x_k; y_k)$  от этой прямой равно  $y_k - ax_k - b$ ; согласно принципу наименьших квадратов, числа  $a$  и  $b$  надо подобрать так, чтобы минимизировать сумму

$$z = (y_1 - ax_1 - b)^2 + (y_2 - ax_2 - b)^2 + \dots + (y_n - ax_n - b)^2$$

как функцию двух переменных  $a$  и  $b$ . Частные производные

$$\frac{\partial z}{\partial a} = 2(y_1 - ax_1 - b)(-x_1) + 2(y_2 - ax_2 - b)(-x_2) + \dots + 2(y_n - ax_n - b)(-x_n),$$

$$\frac{\partial z}{\partial b} = 2(y_1 - ax_1 - b)(-1) + 2(y_2 - ax_2 - b)(-1) + \dots + 2(y_n - ax_n - b)(-1).$$

Стационарная точка находится из равенств

$$\begin{cases} \sum_{k=1}^n y_k x_k - a \sum_{k=1}^n x_k^2 - b \sum_{k=1}^n x_k = 0, \\ \sum_{k=1}^n y_k - a \sum_{k=1}^n x_k - nb = 0 \end{cases}$$

## §4. Задача об эксплуатации автомобиля

### Апроксимация

### Метод наименьших квадратов



$t$ , лет	1	2	3	4	5	6	7	8
$S$ , тыс. руб.	120	140	230	370	445	570	655	770

$$S = a \cdot t + b$$

$t$	$S$	$t^2$	$t \cdot S$
1	120	1	120
2	140	4	280
3	230	9	690
4	370	16	1480
5	445	25	2225
6	570	36	3420
7	655	49	4585
8	770	64	6160
<b>36</b>	<b>3300</b>	<b>204</b>	<b>18960</b>

$$\begin{cases} a \sum_{i=1}^n t_i^2 + b \sum_{i=1}^n t_i = \sum_{i=1}^n t_i \cdot S_i, \\ a \sum_{i=1}^n t_i + nb = \sum_{i=1}^n S_i. \end{cases}$$


$$\begin{cases} a \cdot 204 + b \cdot 36 = 18960, \\ a \cdot 36 + 8 \cdot b = 3300 \end{cases}$$



## §4. Задача об эксплуатации автомобиля


### Апроксимация

### Метод наименьших квадратов



$$S(10) = 97,857 \cdot 10 - 27,857 = 950,713$$

## §5. Математическое моделирование



**Математическое моделирование –** идеальное, научное, знаковое моделирование, при котором описание объекта осуществляется на языке математики, а исследования модели проводятся с использованием математических методов.

## §5. Математическое моделирование

### Классификация математических моделей

в зависимости от:

- Сложности объекта моделирования;
- Оператора модели;
- Входных и выходных параметров;
- Способа исследования модели;
- Цели моделирования.

## §5. Математическое моделирование

**Классификация математических моделей** в зависимости от:

- Сложности объекта моделирования;
- Оператора модели;
- Входных и выходных параметров;
- Способа исследования модели;
- Цели моделирования.



## §5. Математическое моделирование

$$A: X \rightarrow Y, \quad X \in \Omega_X, \quad Y \in \Omega_Y$$

Классификация математических моделей в зависимости от:

- Сложности объекта моделирования;
- Оператора модели;**
- Входных и выходных параметров;
- Способа исследования модели;
- Цели моделирования.



# §5. Математическое моделирование

Классификация математических моделей в зависимости от:



## §5. Математическое моделирование

**Классификация математических моделей** в зависимости от:


- Сложности объекта моделирования;
- Оператора модели;
- Входных и выходных параметров;
- Способа исследования модели;
- Цели моделирования.



## §5. Математическое моделирование

**Классификация математических моделей** в зависимости от:

- Сложности объекта моделирования;
- Оператора модели;
- Входных и выходных параметров;
- Способа исследования модели;
- Цели моделирования.



## §5. Математическое моделирование



Этапы построения  
математической модели



**Абатурова Вера Сергеевна**  
к.п.н.; зав. отделом образовательных и  
информационных технологий Южного  
математического института Владикавказского  
научного центра РАН;  
директор ВЦНМО

Владикавказский центр  
непрерывного математического  
образования



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Учебная серия

В. С. Абатурова

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ШКОЛЬНИКАМ

1

ЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ

Владикавказ  
2007



## §5. Математическое моделирование

**Задача Ньютона** [19]. Трава на лугу растет одинаково густо и быстро. Известно, что 70 коров поели бы ее за 24 дня, а 30 коров за 60 дней. Сколько коров поели бы всю траву за 96 дней?

- а - количество единиц травы, которое было на лугу первоначально;
- б - количество единиц травы, которое ежедневно вырастает на лугу;
- с - количество единиц травы, которое ежедневно съедает одна корова.

$$\begin{cases} a + 24b = 1680c, \\ a + 60b = 1800c, \\ a + 96b = 96xc. \end{cases}$$

Ответ: 20 коров.

1. Выбор переменных.
2. Запись ограничений на переменные.
3. Формулировка требований задачи на языке математики (с помощью переменных).
4. Решение математической задачи.
5. Интерпретация результатов. Запись ответа.

# Основы математической обработки информации

Продолжение следует...