

# Логарифмические неравенства

• *Логарифмическими* неравенствами называют неравенства вида

$$\log_a f(x) > \log_a g(x)$$

$$a > 0, a \neq 1$$

$$f(x) > 0$$

$$g(x) > 0$$

$$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a f(x) > \log_a g(x) \Leftrightarrow \log_a f(x) - \log_a g(x) > 0 \Leftrightarrow$$


$$\Leftrightarrow \log_a \frac{f(x)}{g(x)} > 0$$

$$\log_a t > 0$$

$$a > 0, a \neq 1, t = \frac{f(x)}{g(x)}$$


$$\log_a t > 0, a > 0, a \neq 1, t = \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$a > 1$$




$$t > 1 \Leftrightarrow \frac{f(x)}{g(x)} > 1 \Leftrightarrow f(x) > g(x)$$

$$0 < a < 1$$



$$0 < t < 1 \Leftrightarrow 0 < \frac{f(x)}{g(x)} < 1 \Leftrightarrow f(x) < g(x)$$

**Теорема.** Если  $f(x) > 0$  и  $g(x) > 0$ , то:  
при  $a > 1$  логарифмическое неравенство  $\log_a f(x) > \log_a g(x)$  равносильно неравенству того же смысла:  $f(x) > g(x)$ ;  
при  $0 < a < 1$  логарифмическое неравенство  $\log_a f(x) > \log_a g(x)$  равносильно неравенству противоположного смысла:  $f(x) < g(x)$ .




# Пример:


Решить неравенства а)  $\log_3(2x - 4) > \log_3(14 - x)$ ;  
б)  $\log_{\frac{1}{3}}(2x - 4) > \log_{\frac{1}{3}}(14 - x)$ .

Решение:


$$\begin{cases} 2x - 4 > 0 \\ 14 - x > 0 \\ 2x - 4 > 14 - x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 2 \\ x < 14 \\ x > 6 \end{cases}$$



Ответ: а)  $x \in (6; 14)$ ; б)  $x \in (2; 6)$ .



$$\begin{cases} 2x - 4 > 0 \\ 14 - x > 0 \\ 2x - 4 < 14 - x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 2 \\ x < 14 \\ x < 6 \end{cases}$$



# Пример:


Решить неравенство  $\log_8(x^2 - 7x) > 1$ .

Решение:


$$1 = \log_8 8$$

$$\log_8(x^2 - 7x) > 1 \Leftrightarrow \log_8(x^2 - 7x) > \log_8 8$$

$$\begin{cases} x^2 - 7x > 0 \\ x^2 - 7x > 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x(x - 7) > 0 \\ x^2 - 7x - 8 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in (-\infty; 0) \cup (7; +\infty) \\ x \in (-\infty; -1) \cup (8; +\infty) \end{cases}$$



Ответ:  $x \in (-\infty; -1) \cup (8; +\infty)$ .





# Пример:


Решить неравенство  $\log_{\frac{1}{2}}(16 + 4x - x^2) \leq -4$ .

Решение:


$$-4 = -4 \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{2} = \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2}\right)^{-4} = \log_{\frac{1}{2}} 16$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(16 + 4x - x^2) \leq -4 \Leftrightarrow \log_{\frac{1}{2}}(16 + 4x - x^2) \leq \log_{\frac{1}{2}} 16$$

$$\begin{cases} 16 + 4x - x^2 > 0 \\ 16 + 4x - x^2 \geq 16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in (2 - 2\sqrt{5}; 2 + 2\sqrt{5}) \\ x \in [0; 4] \end{cases}$$



Ответ:  $x \in [0; 4]$ .



# Пример:

Решить неравенство  $\lg x + \lg(45 - x) < 2 + \lg 2$ .


Решение:

$$\lg x + \lg(45 - x) = \lg x(45 - x) = \lg(45x - x^2)$$


$$2 + \lg 2 = 2 \lg 10 + \lg 2 = \lg 10^2 + \lg 2 = \lg 100 + \lg 2 = \lg 200$$

$$\lg x + \lg(45 - x) < 2 + \lg 2 \Leftrightarrow \lg(45x - x^2) < \lg 200$$

$$\begin{cases} x > 0 \\ 45 - x > 0 \\ 45x - x^2 < 200 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x < 45 \\ x \in (-\infty; 5) \cup (40; +\infty) \end{cases}$$



Ответ:  $x \in (0; 5) \cup (40; 45)$ .



# Пример:

Решить неравенство  $\log_{\frac{1}{2}} x + 3 \log_{\frac{1}{2}} x < -2$ .

Решение:


$$\log_{\frac{1}{2}} x = a \Rightarrow \log_{\frac{1}{2}} x + 3 \log_{\frac{1}{2}} x < -2 \Leftrightarrow a^2 + 3a < -2 \Leftrightarrow -2 < a < -1$$

$$-2 < \log_{\frac{1}{2}} x < -1$$

$$-2 \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{2} < \log_{\frac{1}{2}} x < -1 \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{2}$$
$$\log_{\frac{1}{2}} \left( \frac{1}{2} \right)^{-2} < \log_{\frac{1}{2}} x < \log_{\frac{1}{2}} \left( \frac{1}{2} \right)^{-1}$$

$$\log_{\frac{1}{2}} 4 < \log_{\frac{1}{2}} x < \log_{\frac{1}{2}} 2$$

$$4 > x > 2$$




Ответ:  $x \in (2; 4)$ .

# Алгоритм решения логарифмических неравенств:

1. Уравнять основания логарифмов.

2.



3. Решить полученную систему.