





Терофиты

Работа выполнена
студентами 2ЛА, 1 группы:
Гарновский Илья
Кострова Александра
Башарина Валерия
Яковлева Анна
Елькина Мария

Определение

Терофиты (от греч. — лето и растения) — жизненная форма в системе Раункиера означающая однолетние растения, полностью отмирающие к зиме, но сохраняющие жизнеспособные семена для борьбы с засухой. Эти однолетние травы господствуют в полупустынях и пустынях (73%), в сухих степях (представители крестоцветных, сложноцветных, маковых, маревых и др.)




Ромáшка (лат. Matricária)

- Представители рода широко распространены в Евразии, Америке и Южной Африке, натурализованы в Австралии. В Центральной Африке несколько видов ромашки были полностью уничтожены местными племенами из-за суеверий, что эти растения якобы привлекают злых духов



Марья́нник ро́зовый (лат. *Melampýrum roseum*)

- Встречается на Дальнем Востоке России и в Азии (Китай, Япония)
-



Костёр мягкий

(лат. *Brómus hordeáceus*)

- Центр ареала — Средиземноморье, в настоящее время распространён по всей Европе от Южной Скандинавии на севере до Южной Европы на юге, также встречается в Малой Азии, в Северной Африке, на Кавказе, в Иране. В России — по всей Европейской части и в Предкавказье, как заносное растение — по всей Сибири



Трясу́нка больша́я (лат. *Briza maxima*)

- Естественный ареал трясушки большой охватывает Средиземноморье (в том числе Северную Африку) и Малую Азию. Как заносное может встречаться во многих других странах — обычно вдоль дорог, в населённых пунктах, на сухих лугах



Сédум (лат. Sedum)

- Произрастает в Евразии, Африке, Северной и Южной Америке. Предпочитает луга, сухие склоны.
-



Скабио́за (лат. Scabiósa)

- Произрастают в умеренном климате Старого Света. Предпочитают селиться на известковых почвах.
-



Шалфе́й (лат. *Salvia*)

- Представители рода распространены во всех частях Старого и Нового Света
-



Фацелия (лат. Phacelia)

- Произрастает в Северной и Южной Америке.
-



Физа́лис (лат. Phýsalis)

- Наибольшее видовое разнообразие наблюдается в Центральной и Южной Америке
-



Цинерáрия (лат. Cinerária)

- Распространены на острове Мадагаскар и в тропической Африке
-

