

Элементы теории множеств

- **Дискретная математика (ДМ), или дискретный анализ** - область математики, которая занимается исследованиями структур и задач на конечных множествах. Поэтому в качестве синонима иногда используется термин "конечная математика".

МАТЕМАТИКА



ДИСКРЕТНАЯ

антоним

НЕПРЕРЫВНАЯ


изучаемые разделы:

входят в данный курс

- логика высказываний
- математическая логика
- теория множеств
- теория графов
- комбинаторика
- криптология
- теория алгоритмов
- теория автоматов
- и т.д. ...

входят все области математики, которые занимаются *непрерывными* функциями (графики которых – непрерывные кривые, аргументы – действительные числа):

- математический анализ
- дифференциальное исчисление
- интегральное исчисление



Определение

- Одним из фундаментальных, неопределяемых математических понятий является понятие **множества**.
- Множество можно представить себе как *соединение, совокупность, собрание* некоторых предметов, объединенных по какому-либо признаку:
 - множество учащихся класса,
 - множество букв алфавита,
 - множество натуральных чисел,
 - множество точек на прямой,
 - множество книг на полке и т.д..

Определение

- Предметы, из которых состоит множество, называются его **элементами**
- например, буква К – элемент множества букв русского алфавита.
- Для названия множества иногда используют какое-либо одно слово, выступающее в роли синонима слова «множество» (зрители, стая, семья, фрукты).

- Обозначают множества заглавными буквами латинского алфавита или символически с помощью фигурных скобок, в которых указываются его элементы.
- Сами элементы некоторого множества будем обозначать малыми латинскими буквами, если они не имеют специальных обозначений:
- A; {a, b, c}; {* , s, h, g}; N={1,2,3,4,5,6,7,8, ...}.

- Принадлежность предмета некоторому множеству обозначают с помощью символа \in (в противном случае используется символ \notin).
- Запись $a \in A$ означает, что a есть элемент множества A .
- Аналогично имеем: $\Delta \in \{\Delta, o\}$.
- Запись $4 \notin \{1, 2, 3\}$ означает, что 4 не принадлежит множеству $\{1, 2, 3\}$.



Основными способами задания множества являются:

- 1) перечисление всех его элементов:
 $A=\{a_1, a_2, \dots, a_n\};$
- 2) описание (указание характеристического свойства его элементов). Этот способ требует указания такого признака, который имеется у всех элементов данного множества и не свойственен элементам, не входящим в данное множество.

- Например, характеристическим свойством **натуральных чисел** является возможность их использования при счете каких-либо предметов.
- Говоря о множестве **четных чисел**, мы указываем характеристическое свойство его элементов: $M=\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ делится на 2}\}$, т.е. каждое число, принадлежащее этому множеству, делится на два.

Определение 3

- Множества, состоящие из одних и тех же элементов (одинаковыми). Пишут $A=B$.

Определение 4

- Множество, которое не содержит ни одного элемента, называется *пустым* и обозначается символом \emptyset .

- Слово «много» и математический термин «множество» имеют различный смысл.
- Множество может состоять из небольшого количества элементов.
- Будем обозначать количество элементов в некотором множестве A через $m(A)$.
- Например, если $A=\{a, b, c\}$, то $m(A)=3$. Если N – множество всех натуральных чисел, то $m(N) = \infty$.

Подмножество. Основные числовые множества

- **Определение 1.**
- Множество В, состоящее из некоторых элементов данного множества А (и только из них), называется *подмножеством (частью)* этого множества.
- Иначе, если любой элемент множества В принадлежит также множеству А, то множество В называется подмножеством множества А.
- Это записывается так: $B \subset A$ или $A \supset B$. Говорят, что «В – подмножество А» или «В содержится в А» или «А содержит В».
- Заметим, что $m(B) \leq m(A)$.

- Если в множестве B находится хотя бы один элемент, не принадлежащий множеству A , то B не является подмножеством множества A : $B \not\subset A$.
- Например, отрезок $[a, b]$ не является подмножеством полуинтервала $(a, b]$, т. к. $a \in [a, b]$, но $a \notin (a, b]$.

- Из опр. 1 следует, что любое множество является подмножеством самого себя, т.е. справедливо утверждение $A \subseteq A$.
- Полагают также, что пустое множество является подмножеством любого множества.
- Пустое множество не содержит ни одного элемента, а значит в нем нет элемента, не принадлежащего любому другому множеству.









- Знак \subset называется знаком включения.
- Отметим основные свойства отношения включения между множествами:
 - 1) $\emptyset \subset A$ для любого множества A ;
 - 2) $A \subset A$ для любого множества A (рефлексивность);
 - 3) из того, что $B \subset A$ не следует $A \subset B$ (не симметричность);
 - 4) если $A \subset B$ и $B \subset A$, то $A = B$ (антисимметричность);
 - 5) если $A \subset B$ и $B \subset C$, то $A \subset C$ (транзитивность).

Основные числовые множества:

- $N = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$ – множество натуральных чисел;
- $Z = \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$ – множество целых чисел (содержит все натуральные числа и числа, им противоположные), $N \subset Z$;
- $Q = \{x \mid x = p/q, \text{ где } p \in Z, q \in N\}$ – множество рациональных чисел (состоит из чисел, допускающих представление в виде дроби), $N \subset Z \subset Q$;
- $R = (-\infty; +\infty)$ – множество действительных чисел, $Q \subset R$ (кроме всех рациональных чисел, содержит иррациональные числа).

- Действительные числа изображаются точками координатной прямой (числовой оси).
- Координатная прямая – это всякая прямая (обычно горизонтальная), на которой указаны положительное направление, начало отсчета и единичный отрезок.

Таблица 1. Правила изображения числовых промежутков.

Название	Неравенство, определяющее множество	Обозначение	Изображение
Отрезок от a до b (замкнутый промежуток)	$a \leq x \leq b$	$[a;b]$	
Интервал от a до b	$a < x < b$	$(a;b)$	
Полуинтервалы от a до b	$a < x \leq b$	$(a;b]$	
	$a \leq x < b$	$[a;b)$	
Числовой луч от a до $+\infty$	$a \leq x$	$[a;+\infty)$	
Открытый числовой луч от a до $+\infty$	$a < x$	$(a;+\infty)$	
Числовой луч от $-\infty$ до a	$x \leq a$	$(-\infty; a]$	
Открытый числовой луч от $-\infty$ до a	$x < a$	$(-\infty; a)$	

Операции над множествами

- Два множества могут иметь одинаковые элементы,
- из всех элементов двух множеств можно составить одно новое множество,
- также можно рассмотреть отдельно элементы одного множества, которых во втором множестве нет.

- Например, А – множество наклеек (марок), которые есть у Пети, В – множество наклеек, которые собрал Вася.
- Можно выделить множество наклеек, которые есть у обоих ребят;
- коллекцию различных наклеек, собранных ими вместе;
- множество наклеек Пети, которых нет у Васи.
- Таким образом, мы проделали операции **пересечения, объединения и разности** двух множеств.

Определение

- **Пересечением** множеств А и В называется множество С, состоящее из всех **тех и только тех элементов**, которые принадлежат каждому из данных множеств: $C=\{x \mid x \in A \text{ и } x \in B\}$. Обозначается $A \cap B$.

Определение

- **Объединением** множеств А и В называется множество С, которое состоит из всех элементов данных множеств А и В и только из них: $C=\{x | x \in A \text{ или } x \in B\}$.
- Обозначается, $A \cup B$.

- Если множества А и В не содержат одинаковых элементов, т.е. не пересекаются ($A \cap B = \emptyset$), то $m(A \cup B) = m(A) + m(B)$ (1).
- В противном случае, когда множества имеют $m(A \cap B)$ одинаковых элементов, следует пользоваться более общей формулой:

$$m(A \cup B) = m(A) + m(B) - m(A \cap B) \text{ (2).}$$

Определение

- **Разностью** множеств A и B называется множество C , состоящее из всех элементов множества A , не принадлежащих множеству B :
$$C=\{x \mid x \in A \text{ и } x \notin B\}.$$
- Обозначается, $A \setminus B$.
- В случае, когда B является подмножеством A , т.е. $B \subset A$, разность $A \setminus B$ называется **дополнением множества B до множества A** (или относительно множества A).

Определение

- **Универсальным множеством** называется множество, подмножества которого (и только они) в данный момент рассматриваются.
- Обозначают U .
- При работе с числовыми множествами в качестве основного (универсального) множества будем считать множество R действительных чисел.

Определение

- Дополнением множества А называется разность $U \setminus A$.
- Обозначается, A' и читается «не А» .
- Иначе, дополнением множества А называется множество A' , состоящее из всех элементов, не принадлежащих множеству А.

Свойства операции пересечения:

- 1) $A \cap A = A$;
- 2) $A \cap \emptyset = \emptyset$;
- 3) $A \cap A' = \emptyset$;
- 4) $A \cap U = A$;
- 5) $A \cap B = B \cap A$.

Свойства операции объединения:

- 1) $A \cup A = A$;
- 2) $A \cup \emptyset = A$;
- 3) $A \cup A' = U$;
- 4) $A \cup U = U$;
- 5) $A \cup B = B \cup A$.

Свойства операции разности:

- 1) $A \setminus A = \emptyset$;
- 2) $A \setminus \emptyset = A$;
- 3) $A \setminus A' = A$;
- 4) $A \setminus U = \emptyset$;
- 5) $U \setminus A = A'$;
- 6) $\emptyset \setminus A = \emptyset$;
- 7) $A \setminus B \neq B \setminus A$.

Справедливы равенства $(\overline{A \cup B}) = \overline{A} \cap \overline{B}$; $(\overline{A \cap B}) = \overline{A} \cup \overline{B}$ (3).

Диаграммы Эйлера-Венна

- Для наглядного представления множеств и результатов операций над ними удобно пользоваться диаграммами Эйлера-Венна (кругами Эйлера).
- При этом множества изображаются на плоскости в виде замкнутых кругов, а универсальное множество в виде прямоугольника.
- Элементы множества – точки внутри соответствующего круга.




Рис. 1




Рис.2 Пересечение множеств




Рис.3 Объединение множеств




Рис.4 Разность множеств $A \setminus B$




Рис.5 Разность множеств $B \setminus A$




Рис.6 Пересечение трех множеств




Рис.7 Дополнение множества
(множество $ne-A$)

- Формула для подсчета числа элементов в объединении трех множеств:
- $m(A \cup B \cup C) = m(A) + m(B) + m(C) - m(A \cap B) - m(A \cap C) - m(B \cap C) + m(A \cap B \cap C)$

Примеры

- **Пример 1.** Записать множество всех натуральных делителей числа 15 и найти число его элементов.
- Решение: $A=\{1, 3, 5\}$, $m(A)=3$.

Пример 2


- Даны множества $A=\{2, 3, 5, 8, 13, 15\}$, $B=\{1, 3, 4, 8, 16\}$,
 $C=\{12, 13, 15, 16\}$, $D=\{0, 1, 20\}$.
- Найти $A \cup B$, $C \cup D$, $B \cap C$, $A \cap D$, $A \setminus C$, $D \setminus B$, $A \cup B \cup C$,
 $A \cap B \cap C$, $B \cup D \cap C$, $A \cap C \setminus D$.
- **Решение:**
- Учтем, что сначала должна выполняться операция пересечения множеств, а затем объединение или разность.
- Получим
- $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 15, 16\}$,
- $C \cup D = \{0, 1, 12, 13, 15, 16, 20\}$,
- $B \cap C = \{16\}$, $A \cap D = \emptyset$, $A \setminus C = \{2, 3, 5, 8\}$, $D \setminus B = \{0, 20\}$,
- $A \cup B \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 15, 16\}$,
- $A \cap B \cap C = \emptyset$, $B \cup D \cap C = \{1, 3, 4, 8, 16\}$, $A \cap C \setminus D = \{13, 15\}$

Пример 3.

- Экзамен по математике сдавали 250 абитуриентов, оценку ниже пяти получили 180 человек, а выдержали этот экзамен 210 абитуриентов. Сколько человек получили оценки 3 и 4?
- Решение: Пусть A – множество абитуриентов, выдержавших экзамен, B – множество абитуриентов, получивших оценку ниже 5, по условию $m(A)=210$, $m(B)=180$, $m(A \cup B)=250$. Абитуриенты, получившие оценки 3 и 4, образуют множество $A \cap B$.
- Из формулы (2) находим $m(A \cap B) = m(A) + m(B) - m(A \cup B) = 210 + 180 - 250 = 140$.

Пример 4.


- В школе 1400 учеников.
- Из них 1250 умеют кататься на лыжах, 952 – на коньках.
- Не умеют кататься 60 учащихся.
- Сколько учащихся умеют кататься и на коньках и на лыжах?
- Решение: Множество учеников школы будем считать основным множеством U , А и В – соответственно множества учеников, умеющих кататься на лыжах и на коньках .




- Учащиеся, не умеющие кататься ни на лыжах, ни на коньках, составляют множество $A' \cap B' = (A \cup B)'$
- $m(A \cup B) = m(U) - m(A \cup B)' = 1340$.
- $m(A \cap B) = m(A) + m(B) - m(A \cup B) = 862$

Пример 5. Показать на кругах Эйлера множество $(A' \setminus B') \cup (B \cap C)$.


Решение:



$$A' \setminus B'$$



$$B \cap C$$



$$(A' \setminus B') \cup (B \cap C)$$