

# Сино- каротидное соустье

**Является тяжелой  
сосудистой патологией,  
возникающей в  
результате образования  
сообщения между сонной  
артерией и кавернозным  
синусом.**

# ПРИЧИНЫ

- черепно-мозговая травма
- атеросклероз
- аневризмы пещеристой части внутренней сонной артерии

Частичный сброс артериальной крови в пещеристый синус. Поступающая в синус артериальная кровь смешивается с венозной кровью, увеличивая объемные параметры кавернозного синуса. В результате этого часть смешанной артериовенозной крови из пещеристой пазухи дренируется в вены глазницы, происходит расширение верхней глазничной вены.

# Классификация

- ▣ Острый
- ▣ Период компенсации
- ▣ Период субкомпенсации
- ▣ Период декомпенсации

# Первичные СИМПТОМЫ

- экзофтальм
- аневризматический шум, синхронный с пульсом, который определяется над орбитой или в сосцевидной области.
- расширение и пульсация вен лица и свода черепа
- явления застоя крови в глазном яблоке, отек конъюнктивы(хемоз), расширение ее вен, застой крови в сосудах радужки и сетчатки.
- повышение внутриглазного давления
- диплопия
- нарушение подвижности глазного яблока
- птоз верхнего века
- нарушение чувствительности роговицы

# Вторичные симптомы

- ▣ атрофия ретробульбарной клетчатки
- ▣ кровоизлияния в ретробульбарную клетчатку
- ▣ язва роговицы
- ▣ тромбоз вен глазницы и глаукома
- ▣ атрофия диска зрительного нерва.
- ▣ кровотечение из сосудов глазного яблока

# Диагностика

- МРТ
- МРТ- ангиография
- КТ
- КТ- ангиография
- Рентгенография



# Лечение

# Дренирование соустья.