


# Природная зона тайги

Тайга — биом, характеризующийся преобладанием хвойных лесов ( boreальных видов ели, пихты, лиственницы, сосны, в том числе кедровой). Располагается в северной субарктической влажной географической зоне. Хвойные деревья составляют там основу растительной жизни. Для этой зоны также характерны болота, которые покрывают северную Сибирь. Тайга — самая большая по площади ландшафтная зона России. Её ширина в Европейской части достигает 800 километров, а в Западной и Восточной Сибири — 2150 километров. Таёжные зоны России стали формироваться ещё до наступления ледников.



*По видовому составу различают светлохвойную (сосна обыкновенная, некоторые американские виды сосны, лиственницы сибирская и даурская) и более характерную и распространённую - темнохвойную тайгу (ель, пихта, кедровая сосна). Древесные породы могут образовывать чистые (еловые, лиственичные) и смешанные (елово-пихтовые) древостои.*

брусника



Тайге свойственно отсутствие или слабое развитие подлеска (так как в лесу мало света), а также однообразие травяно-кустарникового яруса и мохового покрова (зелёные мхи). Виды кустарников, кустарничков и трав немногочисленны.

можжевельник



рододендрон даурский



грушанка



**Многочисленны и широко распространены: рысь, росомаха, бурундук, соболь, белка и др. Из копытных встречаются северный и Благородный олень, лось, косуля; многочисленны зайцы, бурозубки, грызуны: мыши, полёвки, белки обыкновенная и летяга, бурундуки. Из птиц обычны: глухарь, обыкновенный рябчик, кедровка, клесты и др. В таёжном лесу по сравнению с лесотундрой благоприятнее условия для жизни животных. Здесь больше оседлых животных. Нигде в мире, кроме тайги, не водится столько пушных зверей.**

**В зимний период подавляющее число видов беспозвоночных, все земноводные и пресмыкающиеся, а также некоторые виды млекопитающих погружаются в анабиоз и зимнюю спячку, снижается активность ряда других животных.**

**белка-летяга**



**глухарь**



**рысь**



**росомаха**



**лось**

# Характеристика почвы

Дернов -подзолистая . Испаряемость  
о 54 мм , осадк 55 м , Средняя  $t^{\circ}$  в  
июле 1 и 2  $^{\circ}\text{C}$ , зимо<sup>м</sup> средняя  $t^{\circ}$   
января<sup>7</sup> на запад й - 6  $^{\circ}\text{C}$ , а на востоке  
- 1  $^{\circ}\text{C}$  а е а

Увлажнённость достаточная . -6 %  
гумуса . 1

**Традиционные занятия  
населения — охота на  
пушного зверя, сбор  
лекарственного сырья,  
дикорастущих плодов,  
орехов, ягод и грибов,  
ловля рыбы,  
лесопромысловое  
хозяйство  
(строительство  
домов), скотоводство.**

