


*Физиология
гепато-билиарной
системы*

Схема строения гепато-билиарной системы.



Перфузия в печени

- 1500 мл крови в минуту(hepatic blood flow - HBF - 25% сердечного выброса)
- $\frac{3}{4}$ HBF - воротная вена;
- $\frac{1}{4}$ HBF - печеночная артерия

Регуляторы НВФ

1. механизмы саморегуляции.

Механизмы

Гормоны ЖКТ
(гистамин, гастрин,
холецистокинин, секретин,
VIP)

Расширение печеночной
артерии

3.
(вазопрессин, ангиотензин)

Сужение воротной вены и
печеночной артерии

4.
Нервная стимуляция:
а) адренергическая

Расширение/сужение
печеночной артерии
Неясно

б)
5) парасимпатическая
Лекарства:
-пропранолол
-дофамин

Уменьшает НВФ
Временное сужение
печеночной артерии,
последующее ее расширение;
сужение воротной вены

Гетерогенность гепатоцитов

	Зона 1	Зона 3
Метаболизм глюкозы	Глюконеогенез	Гликолиз
Метаболизм гликогена	Деградация	Синтез
Детоксификация аммиака	Мочевина	Глутамин
Секреция желчи	Зависимая от желчных кислот	Независимая от желчных кислот
Поглощение кислорода	Максимальное	Минимальное
Способность к регенерации	Максимальная	Минимальная


Механизмы поглощения веществ печенью

- Неорганические ионы - Na/K-АТФаза, Na/H-насос, Ca-АТФаза, Ca/Mg-АТФаза, хлориды - пассивный транспорт, бикарбонаты - котранспорт с Na
- Органические анионы (желчные кислоты, билирубин)
- Макромолекулы - рецептор-зависимый ЭНДОЦИТОЗ

Гемостатические функции гепатоцитов


1. Синтез всех прокоагулянтов, кроме фактора 8.
2. Посттрансляционная модификация факторов 2, 7, 9 и 10 (витамин К-зависимая гамма-карбоксилирование).
3. Синтез регуляторов коагуляции (протеин С, протеин S, антитромбин 3 и др.)
4. Синтез фибринолитических пептидов (плазминоген, его активатор).
5. Клиренс активированных прокоагулянтов.

Состав желчи человека




2.2%- жирные кислоты, муцин, ионы

Синтез желчных кислот



Выделение желчных пигментов



Факторы регуляции регенерации печени

- кровоток в воротной вене
- гормональные факторы (инсулин, глюкагон, катехоламины, вазопрессин, ТРФ, ЭРФ; фактор, стимулирующий рост гепатоцитов)
- количественные различия в экспрессии генов гепатоцитов
- протоонкогенная экспрессия
- изменения массы печени (частичная гепатэктомия, трансплантация печени).

Резюме

1. Гепато-билиарная система занимает центральное место в обмене веществ.

2. Секретируемая печенью желчь необходима для нормального функционирования пищеварительной системы.