


# Внутренняя среда организма

[Prezentacii.com](http://Prezentacii.com)



# Внутренняя среда

## организма

это единая система жидкостей – является естественным продолжением водной основы клеток.

Кровь



Межклеточная жидкость



Лимфа



# КОМПОНЕНТЫ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ И ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕ

**Кровь**

**Двигается по замкнутым сосудам и непосредственно с клетками не контактирует.**

**Тканевая жидкость**

***Располагается между клетками тканей, образуется из жидкой части крови.***

**Лимфа**

***Располагается в лимфатических сосудах, образуется из тканевой жидкости.***

# Свойства внутренней среды организма

- ❖ Внутренняя среда организма имеет относительное постоянство состава и физико-химических свойств. Только при этом условии клетки могут нормально функционировать.

Такое постоянство среды называется **гомеостаз** (др.-греч. **ὁμοιοστάσις** от **ὁμοιος** — одинаковый, подобный и **στάσις** — стояние, неподвижность) .



# Внешняя среда



Нервная система

Система выделения

Система дыхания

Система пищеварения

Эндокринная система

Кровь

# Внутренняя среда

Интерстициальная жидкость


Тканевая жидкость

Микросреда

Лимфа




# Межклеточное вещество



кислород

вода

Питательные  
вещества



продукты  
обмена

углекислый  
газ




**Связь компонентов  
внутренней среды клетки**






# Гомеостаз

Американский физиолог **Уолтер Кенноны** (Walter B. Cannon) в 1932 году в своей книге «The Wisdom of the Body» («Мудрость тела») предложил этот термин как название для «координированных физиологических процессов, которое поддерживают большинство устойчивых состояний организма». В дальнейшем этот термин распространился на способность динамически сохранять постоянство своего внутреннего состояния любой открытой системы. Однако представление о постоянстве внутренней среды было сформулировано ещё в 1878 году



# КрОВЬ.





# Функции крови

❖ **Транспортная:**

газообмен, перенос питательных веществ,

витаминов, минеральных веществ

удаление из тканей конечных

продуктов метаболизма, избытка

воды и солей, перенос гормонов



❖ **Защитная:**

участие в клеточных и гуморальных


механизмах иммунитета



❖ **Регуляторная**

регуляция температуры,

водно – солевого баланса



# Расслоение крови



При отстаивании в пробирке или центрифугировании кровь можно разделить на фракции.

# Состав крови.

Кровь

Плазма

Форменные  
элементы

Форменные элементы (40-50%)



Плазма (60-50%)

# Состав плазмы крови

## Неорганические вещества

- ◆ Вода
- ◆ Минеральные вещества

## Органические вещества

- ◆ Углеводы
- ◆ Жиры
- ◆ Белки

*(Растворимый белок фибриноген превращающийся в нерастворимый белок фибрин )*



Хлористый натрий содержится в плазме крови и тканевых жидкостях организма являясь важнейшим неорганическим компонентом, поддерживающим соответствующее осмотическое давление плазмы крови


- ❖ 0,85 – 0,9 % раствор хлорида натрия – физиологический раствор
- ❖ Растворы, осмотическое давление которых такое же как у плазмы крови называют изотоническим.
- ❖ Растворы с большим осмотическим давлением, называются гипертоническим
- ❖ С меньшим - гипотоническим



Фо  
эл




❖ **Форменные элементы крови образуются в красном костном мозге.**



❖ **Процесс образования элементов крови называется **гемопоэзом.****

Расположение  
красного  
костного  
мозга




После рождения и в течение всей жизни человека **костный мозг** является единственным **кровообразующим органом**. У ребенка **красный (активный) костный мозг** располагается во всех костях скелета, а с 3-4-летнего возраста начинается постепенное его замещение на жировой, и у взрослого человека **красный костный мозг** располагается в губчатых костях скелета и эпифизах трубчатых костей.







# Эритроциты



- ❖ Дисковидные двояковогнутые клетки.
- ❖ Зрелые эритроциты не содержат ядра.
- ❖ Содержат белок (протеид) гемоглобин.



**Гемоглобин** состоит из четырех белковых нитей и четырех **гемов**




**Гем**- это органическое соединение содержащее атом железа способного соединяться с кислородом

# Образование эритроцитов

## Схема эритропоэза




Молодой эритроцит с ядром



Взрослый эритроцит без ядра, заполненный гемоглобином



# Функции эритроцитов





**лёгки**

оксигемоглоби  
нЕ

артериальная  
кровь  
(элая)

**Ткань**

оксигемоглоби  
нИ




гемоглобин

кислород

карбогемоглоби  
н

венозная кровь  
(тёмно-  
вишнёвая)



# Переливание крови

❖ В древности люди часто умирали от потери крови в результате ранений на войнах или охоте. Долгое время крови приписывали свойства носителя жизненной силы, души. Ее пытались использовать в лечебных целях. Врачи древности рекомендовали ее пить для омоложения организма и при




❖ Первое успешное внутривенное переливание крови было осуществлено в 1667 г. во Франции Профессор математики и медицины Дени и хирург Эммериц перелили 16-летнему юноше кровь ягненка.

Однако попытки переливания крови как правило приводили к летальному исходу.


# Группы крови

Только в начале XX в. было установлено, что кровь у людей разная. Это открытие принадлежит австрийскому ученому **Карлу Ландштейнеру**. В 1901 г. он опубликовал статью, в которой были представлены результаты экспериментов по выяснению взаимодействия сыворотки крови одного человека и эритроцитов другого. В одних случаях эритроциты склеивались (происходила их агглютинация), а в других – нет. В результате были обнаружены первые антигены крови (**антиген А и антиген В**), и была открыта первая система групп крови – система **ABO**.

Позднее было установлено, что кроме антигенов А и В в крови, точнее на эритроцитах, имеются и другие антигены (факторы крови).













# ГРУППЫ КРОВИ.



*Модель мембраны эритроцита  
со встроенными молекулами групп крови  
разных систем*

На поверхности эритроцитов могут находиться различные антигены – молекулы которые распознаются иммунной системой. Набор таких антигенов определяет группу крови человека. Наиболее важными являются антигены А и В, а также антиген Rh (резус – фактор).


	Группа А	Группа В	Группа АВ	Группа 0
Эритроциты				
Анти-тела плазмы	 Анти-В	 Анти-А	Нет	 Анти-В и Анти-А
Белки эритроцита	 А	 В	 А и В	Нет





Вносим реактив **A**

Вносим реактив **B**



# Результаты анализа

Агглютинация -  
склеивание  
эритроцитов




à ß



ß




á




0

# Переливание крови





# Резус -фактор





Среди агглютиногенов большое значение имеет антиген **Rh** называемый **резус-фактором**. Он получил такое название т.к. впервые был найден в крови обезьяны **макаки-резус** (видовое название) в 1940 году Карлом Ландштернером совместно с Александром Вайнером.

Установлено, что резус-фактор встречается в крови у 85% людей (резусопозитивные люди), а у 15% он отсутствует (резусотрицательные люди).






# Резус - конфликт.

При резус - конфликте во время беременности организм матери вырабатывает антитела к **Rh -антигену плода**. Это может привести к гибели плода или к рождению больного ребенка.



# Лейкоциты

Это бесцветные клетки, содержащие ядро. Форма лейкоцитов может быть различной. Лейкоциты лишены гемоглобина и способны к активному амёбовидному движению, проникая сквозь стенки сосудов, перемещаться между клетками различных тканей. Различают несколько видов лейкоцитов.



# Зернистые лейкоциты-



◆ Имеют крупные  
сегментированные  
ядра и выявляют

специфическую

Нейтрофил  
ы

Эозинофил  
ы

Базофилы



# Незернистые лейкоциты-


- ❖ Не имеют специфичной зернистости цитоплазмы

▲ Ядро – округлое не центрирован

Лимфоцит



Моноциты







# Функции лейкоцитов

Гранулоциты - защищают организм от бактерий и токсинов


Лимфоциты - обеспечивают иммунитет



Моноциты (фагоциты) захватывают инородные тела с помощью ложноножек и пожирают их



# Образование лейкоцитов




Лейкоциты образуются в разных органах тела: в костном мозге, селезенке, тимусе, подмышечных лимфатических узлах, миндалинах и пластинках Пэ́йе, в слизистой оболочке желудка.



- ❖ **Тимус (вилочковая железа)** находится в грудной полости, за грудиной. В ней образуются, размножаются, созревают и учатся отличать "своего" от "чужого" Т-лимфоциты. Костный мозг находится в полостях многих частей скелета, служит местом кроветворения, где образуются В-лимфоциты, незрелые Т-лимфоциты, НК-клетки и фагоциты.
- ❖ **Селезенка** расположена в левой подреберной области брюшной полости, размером с кулак. Она служит резервуаром эритроцитов, отфильтровывает из крови состарившиеся клетки, производит и активизирует некоторые иммунocyты.
- ❖ **Лимфатические сосуды** пронизывают все тело. Заключаящаяся в них жидкость (лимфа) богата лимфоцитами, в основном Т-клетками.
- ❖ **Пластинки Пэйе** - овальные бугорки в слизистой оболочке тонкой кишки, сходные по строению и функциям с миндалинами.

**Антигены.** Распознавание "свой" и "чужой". А кто "чужой"? На поверхности всех клеток и вирусов находятся специфические молекулы, играющие роль паспорта. Если клетка принадлежит этому организму, его иммунная система на её молекулярный паспорт не реагирует, т.к. он для неё "свой". Но если паспорт "чужой", например, на попавшем в организм вирусе, иммунная система подает сигнал тревоги, который запускает сложный механизм защиты и обезвреживания. Молекула, вызывающая такой ответ называется антигеном.

Как выглядят антигены? Чаще всего это белки, но могут быть и углеводы, нуклеиновые кислоты в комбинации с липидами (жирами) или между собой. Антигены бывают **внешние** (бактерии, вирусы, другие паразиты, частицы) и **внутренние** (продукты собственных клеток, например аномальные белки опухолевых клеток или белки в инфицированных вирусом клетках).




# фагоцитоз

Лейкоциты и лимфоциты защищают организм от болезнетворных микробов, обволакивая их ложноножками и пожирая. Процесс поглощения и переваривания лейкоцитами микробов называется **фагоцитозом**, а сами клетки **лейкоциты-фагоцитами**.

## Фагоцитоз



## фагоциты



поглощение фагоцитами  
чужеродных тел


**Фагоциты** - сильно деформирующиеся клетки. Они способны активно проникать в мельчайшие пустоты (а также, например, в стенки сосудов) и пробираться в самые различные



❖ **Задача фагоцитов** - поглотить как можно больше микробов.

Если врагов слишком много, объявляется мобилизация резервов, и количество фагоцитов


в к



растет.

**Фагоцит**

удлиняет ложноножки в направлении бактерий.





**Мечников Илья**

**В 1883 году**

**И.И.Мечников**

**открыл**

**явление**

**фагоцитоза.**

**За исследования по**

**фагоцитозу в 1908**

**году**

**ему был**

**присужде**



# Иммунитет

**Иммунитет** – это защитная реакция организма, связанная с фагоцитозом и выработкой антител.





# Иммунитет

## Специфическ

Уничтожение чужеродных частиц лейкоцитами (в частности, нейтрофилами) в результате фагоцитоза – захват и пожирание частиц непосредственно клетками.

## Неспецифическ

Уничтожение или связывание чужеродных частиц антителами – специфическими – белками, вырабатываемыми в селезёнке, костном мозге и лимфатических узлах.



# Иммунитет

Природный  
(естественный  
)



Искусственный



# Иммунитет природный

**ВИДОВОЙ**  
невосприимчивость  
к заболеваниям  
других видов  
животных



**НАСЛЕДСТВЕННЫЙ**  
врождённое наличие  
защитных механизмов  
против некоторых  
болезней

**ПРИБРЕТЁННЫЙ**

**АКТИВНЫЙ**  
в результате  
болезни



**ПАССИВНЫЙ**  
с молоком матери

# Иммунитет искусственн



**Активный  
полученный в результа  
вакцинации**



**Пассивный,  
полученный в результате  
Введения сыворотки**



# Получение Э. Дженнером



## Воротки против оспы

Метод вакцинации был открыт английским врачом Э.Дженнером в XVIII веке.

Дженнер заметил, что оспой болеют не только люди, но и коровы. На вымени их образуются пузырьки похожие на оспенные. Дженнер привил **жидкость взятую из оспинок коров** здоровому мальчику, а через некоторое время привил ему **человеческую оспу**. Но мальчик не заболел. В его организме после прививки, выработались антитела, которые защищали его от болезни. Жидкость содержащую ослабленные микробы или их яды стали называть **вакциной**. (от лат. *vacca* — корова)






*The Cow-Pock — or — the Wonderful Effects of the New Inoculation! — See the Publications of the Vaccine Society.*

Картина отражает мнение о  
прививках  
у современников Э.Дженера

# Тромбоциты




- ❖ От греч. **θρόμβος** - «ком», «сгусток» и **κύτος** - «клетка» - мелкие плоские бесцветные тельца неправильной формы представляющие собой окружённые мембраной и лишённые ядра фрагменты цитоплазмы гигантских клеток костного мозга — **мегакариоци**



# ❖ Функция тромбоцитов

—

свертывание крови





## **Свертывание крови –**

Это защитное приспособление организма, предохраняющее его от потери крови, за счет образования **тромба**



**Тромб** – сгусток свернувшейся крови, закрывающей место повреждения стенки сосуда



# Рана

Тромбоциты разрушаются

Образуют

Протромбин (неактивная форма фермента)

Тромбопластин (в присутствии солей Ca)

Действует

Превращаются

Фибриноген - растворимый белок

Тромбин (активная форма фермента)

Действует

Превращается

Фибрин Нерастворимый белок



# Тромб

# Лимф



- ❖ **Лимфа** представляет собой слегка желтоватую жидкую ткань.
- ❖ Она состоит из **лимфоплазмы** и форменных элементов, в основном **лимфоцитов** (98 %), а также моноцитов, нейтрофилов, иногда эритроцитов.
- ❖ 1,8% тканевой лимфы составляют белки.
- ❖ После приема пищи, богатой жирами, лимфа может содержать до 1-2% липидов.

# Лимфоциты



По функциональным признакам различают три типа лимфоцитов:

**В-клетки, Т-клетки, НК-клетки.**

- ❖ **В-лимфоциты** распознают чужеродные структуры (**антигены**) вырабатывая при этом специфические **антитела**.
- ❖ **Т-лимфоциты** выполняют функцию регуляции иммунитета. Т-помощники стимулируют выработку антител, а Т-супрессоры тормозят её. Получили обозначение Т -потому, что созревают и дифференцируются в тимусе. Они составляют около 80% лимфоцитов
- ❖ **НК-лимфоциты** осуществляют контроль над качеством клеток организма. При этом НК-лимфоциты способ

воим свойствам отлич  
Т-  
например, раковые кл

**лимфоцит**  
**лимфоцит**



# Запомни




- ❖ В среднем в организме человека 5 литров крови.
- ❖ В  $1 \text{ мм}^2$  крови 5 млн. эритроцитов ( $5 \cdot 10^6$ ).
- ❖ В  $1 \text{ мм}^2$  крови 6-8 тыс. лейкоцитов ( $6 \cdot 10^3$ ).
- ❖ В 1 литре крови  $25 \cdot 10^{12}$  эритроцитов.
- ❖ Эритроциты крови живут 120 дней, таким образом, в течение года образуется  $75 \cdot 10^{12}$  эритроцитов.
- ❖ За 1 минуту через мозг проходит 1 литр крови.
- ❖ В селезенке запасается 300 мл крови.



# Посмотрим, повторим и

# ОМНИМ





# Мозговой штурм





1. В 1940 г. К.Ландштейнер и Винер установили в крови

- человека резус-фактор, который содержится ...
- лейкоцитах
- эритроцита
- тромбоцита
- плазме
- моноцитах


## 2. Какой белок способствует транспорту газов эритроцитами?

- фибрин
- инсулин
- фибриноген
- коллаген
- гемоглобин



# Самостоятельная работа

Подготовьте информацию том, какая группа крови у Вас и ваших одноклассников. Составьте график распределения групп крови в вашем классе.



Например:



The background is a vibrant, abstract painting. It features a large, flowing orange and red shape on the left side, resembling a ribbon or a splash of paint. Several butterflies in various colors (orange, blue, brown) are scattered throughout. There are also several birds in flight, including a white dove and a black bird. The right side of the painting is dominated by bright yellow and orange flowers, possibly sunflowers, with blue and green splatters around them. The overall style is expressive and colorful.

9r5

• **Группы крови**

thank you

# Группы крови у учеников нашего класса

• Неизвестно

• 1

• 2

• 3

• 4

• 15%

• 29%

• 21%

• 35%

• 0%

thank you

# От меньшего к большему

- 4-0%
- 2-21%
- 1-29%
- 3-35%

thank you

# Резус фактор

Rh+

•100%

•0%



thank you

Rh-