


Рельеф дна Мирового океана

1. Изучение рельефа дна Мирового океана

Еще в 19 веке люди очень мало знали о рельефе дна Мирового океана.

Вблизи берегов мореплаватели издавна измеряли глубины с помощью лота - троса с прикрепленным к нему свинцовым грузом. Но все-таки стремление узнать, что скрывает морская пучина, не оставляло ученых. Впервые данные о глубинах и характере дна океанов были получены в 1876 г.

океанографической экспедицией, обошедшей вокруг света на парусном корабле "Челленджер". Длина лота на этом судне составляла 7 км., и, несмотря на то что он был оснащен паровой лебедкой, на каждое измерение уходило 10-12 часов тяжелого труда. Зато удалось доказать, что на дне океанов есть и равнины, и горы, и глубочайшие желоба.



В XX в. немецкий инженер А. Бам изобрел эхолот — прибор, измеряющий глубину по времени прохождения звуковых волн от корабля до дна и обратно. Но до того как эхолот изобрел человек, он уже существовал в природе. Например, многие морские обитатели определяют расстояние до предметов, посылая сигналы и улавливая их отражение. В современных эхолотах используют ультразвук, распространяющийся в воде со скоростью 1500 м/с. Специальные приборы автоматически рисуют картину морского дна по ходу движения судна, а компьютерные программы создают объемное изображение рельефа. Эхолот позволил составить точные карты океанских глубин и представить, как выглядят подводные пейзажи.


далее видео

Рельеф дна Бермудского
треугольника

The image shows a dark, moody landscape. The lower half is a deep blue-grey body of water, possibly a lake or sea. Above it, a dark, heavily clouded sky occupies the upper half. In the far distance, a faint, dark shoreline or mountain range is visible across the water.

aMystery.ru

*Изображение гайота,
полученное с помощь
эхолота*



2. Какие процессы формируют рельеф дна Океана?



Внутренние процессы



Вызывают вертикальные и горизонтальные перемещения участков земной коры, землетрясения и извержения вулканов. Они создают крупные формы рельефа.



Внешние процессы



Осадкообразование, т.е. оседание и накопление обломочных пород, приносимых с суши, а также вулканической пыли и пепла, остатков скелетов и раковин умерших животных.

Рельеф ложа Океана и срединно-океанических хребтов

- Ложе океана занимает более 70% его дна, оно имеет самые большие равнины – котловины, глубина которых от 4 до 7 тыс. м.
- Срединно-океанические хребты – это крупные формы рельефа Мирового океана, образующие единую систему горных сооружений протяжённостью более 60 тыс. км. Относительная высота их – 3-4 км, ширина – до 2 тыс. км.


Части дна Мирового океана





Подводная
окраина
материков

Ложе океана

Переходная
зона








- 1 — шельф
- 2 — материковый склон
- 3 — ложе океана
- 4 — срединно-океанический хребет

- 5 — глубоководный жёлоб
- 6 — вулканический остров
- 7 — подводный вулкан




Шельф

Использование шельфа людьми


- Добыча полезных ископаемых
- Рыболовство




Переходная зона




- 2. материковый склон- часть подводной окраины материка. Является переходной зоной между мелководным шельфом и самой глубокой частью океана – **ложем**.
- Имеет вид достаточно крутого уступа (крутизна до 40 °) шириной 30м. Граница проходит на глубине – 2500-3000 м.



- Глубоководные желоба – длинные узкие океанические впадины. Ширина Ж. – 100-200 м, а длина тыс. км.





Окрайинные
моря


Островные
дуги

Глубоководный
оceanический желоб


Островная дуга

Вулкан над горячей точкой

Вулкан срединно-океанического хребта



Ложе океана




- 1 — шельф
- 2 — материковый склон
- 3 — ложе океана
- 4 — срединно-океанический хребет

- 5 — глубоководный жёлоб
- 6 — вулканический остров
- 7 — подводный вулкан


- 3. Ложе океана – наибольшая по площади и самая глубокая часть дна.
- Имеет сложное неоднородное строение. Ложе всех океанов пересекают СОХ – срединно-океанические хребты. Их общая протяженность в 2 раза превышает длину экватора и составляет 80 000 км. Средняя ширина океанических хребтов – 2,5 тыс. км.
- Отдельные участки хребтов возвышаются над поверхностью в виде островов – Исландия, Св. Елены.

Срединно-
Океанический
хребет



- Вулканы, поднявшиеся над водой образуют вулканические острова (Курильские , Азорские, Канарские)
- В теплых водах на вершинах потухших вулканов поселяются кораллы, образуя коралловые острова в форме кольца с внутренним водоемом - атолл.

Вулканические острова





The end