


ГБОУ СОШ № 608  
КИРОВСКОГО РАЙОНА г.САНКТ -ПЕТЕРБУРГ

# КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ

Подготовила:  
преподаватель-  
организатор ОБЖ  
Карпова Т.А.



# СОДЕРЖАНИЕ

- Определение клинической смерти
- Признаки клинической смерти
- ПМП при клинической смерти



# Клиническая смерть

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ:** Клиническая смерть - это своеобразное переходное состояние между жизнью и смертью



## *Признаки клинической смерти:*

1. отсутствие пульса на сонной или бедренной артерии;
2. отсутствие дыхания;
3. потеря сознания;
4. широкие зрачки и отсутствие их реакции на свет.




# ПРИЗНАКИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

1. УБЕДИТЬСЯ В  
ОТСУТСТВИИ ПУЛЬСА НА  
СОННОЙ  
АРТЕРИИ.



# ПРИЗНАКИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

- Отсутствие сознания
- Отсутствие самостоятельного дыхания




# ПРИЗНАКИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

широкие зрачки и  
отсутствие их реакции на  
свет.



# ПМП ПРИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

Место пульсации сонной  
артерии  
Если пульс не определяется,  
а сознание отсутствует,  
необходимо нанести  
прекардиальный удар –  
однократный сильный удар  
кулаком по груди.



# ПМП ПРИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

Если удар кулаком по груди не дал эффекта и признаки клинической смерти сохраняются, начинайте сердечно-легочную реанимацию.

Вызвать «скорую помощь». Для этого надо позвонить по телефону 03, четко назвать адрес и сказать, что у больного клиническая смерть и проводятся реанимационные мероприятия.

**Помните!**

В подавляющем большинстве случаев без квалифицированной врачебной помощи вернуть больного к жизни не удастся, ваша задача состоит только в том, чтобы поддержать его жизнь до приезда «скорой помощи»!




# ПМП ПРИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

Искусственная вентиляция легких

Для этого необходимо:

1. положить больного на твердую ровную поверхность (лучше на пол).
2. выдвинуть вперед нижнюю челюсть. Для этого положить свою ладонь на лоб реанимируемого, запрокинуть голову, одновременно приподняв подбородок;
3. удалить съемные зубные протезы и другие инородные предметы;
4. в случае отсутствия самостоятельного дыхания плотно зажмите нос больного и производите вдвухания воздуха изо рта в рот с частотой 10–12 дыханий в минуту.



# ПМП ПРИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

## Закрытый массаж сердца

5. начать закрытый массаж сердца. Для этого одну руку положить выступом ладони на нижнюю треть грудины, а вторую выступом ладони на тыльную поверхность первой. При надавливании плечи должны находиться прямо над ладонями, руки в локтях не сгибать.

## Помните!

вдувать воздух в момент сдавления грудной клетки нельзя.



# ЗАПОМНИТЕ, ЧТО РЕАНИМАЦИЯ НЕ ПРОВОДИТСЯ:

- людям, находящимся в сознании;
- людям, находящимся в обмороке, когда есть признаки эффективной сердечной деятельности (пульс на сонных артериях);
- людям, находящимся в терминальной стадии неизлечимого заболевания (например, онкологического);
- если с момента остановки сердечной деятельности прошло более 30 минут или есть явные признаки биологической смерти – холодность кожных покровов, наличие трупных пятен и трупного окоченения, подсыхание роговицы глаза.



**БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!!!**

