



МИР ГАЛАКТИК

ПЛАН

- Типы галактик
- Эволюция галактик
- Наша Галактика

Галактики

Эллиптические
галактики


Спиральные
галактики

Неправильные
галактики

Иглообразные
галактики

Радиогалактик
и





Эллиптические галактики

Эти галактики характеризуются эллиптической формой, обозначаются латинской буквой **E**. Эллиптические галактики ровные, однородные по цвету и симметричные. У таких галактик наблюдается общее падение яркости по мере удаления от центра.



Эллиптическая галактика M87



Эллиптическая галактика M87

В ее центре находится яркое ядро, окруженное размытым сиянием, яркость которого падает по мере удаления от центра. Форма контура галактики остается почти одинаковой на всех уровнях яркости. Все изофоты представляют собой почти идеальные эллипсы, центрированные в точности на ядро галактики. Направления больших осей и отношения большой оси к малой почти одинаковы у всех эллипсов.



Эллиптическая галактика M87



Спиральные галактики



Спиральная галактика NGC 1232

Для спиральных галактик, обозначаемых буквой **S**, характерно наличие диска и балджа (утолщения). Ядро таких галактик представляет собой яркую область, вокруг которой хорошо заметно плоское спиральное распределение яркости.



**У некоторых видимых с
ребра спиральных
галактик заметны мощные
тончайшие прослойки
пыли, пересекающие диск
в самой его середине,
в то время как самые
старые звезды диска
образуют
гораздо более толстый
слой**

**Яркость весьма
регулярным образом
падает по мере удаления
от центра в соответствии
с универсальной
математической
зависимостью**



Спиральная галактика NGC 1232



*Галактика Сомbrero. На рисунке виден необычно большой балдж и темная пыль
распределенная по краю диска галактики*



Неправильные галактики

К неправильным галактикам, обозначаемым **Irr**, относятся объекты, которые не удастся причислить ни к эллиптическим, ни к спиральным. Ни одна из таких галактик не имеет центрального балджа или ядра. Распределение яркости неправильных галактик в среднем падает при переходе от центра наружу.



Большое Магеланово Облако - типичная неправильная галактика



Неправильная форма у галактики может быть вследствие того, что она не успела принять правильной формы из-за малой плотности в ней материи или из-за молодого возраста.

Есть и другая версия: галактика может стать неправильной вследствие искажения формы в результате взаимодействия с другой галактикой.



Галактика NGC 6745. На рисунке видно две галактики. Нижняя правая галактика - меньшая - перемещается. Большая галактика скорее всего была спиральной, однако теперь, она повреждена. Гравитационное поле разрушило форму этой галактики. Газ, пыль и магнитные поля напрямую взаимодействуя "вытягивают" газ из большей галактики, что усиливает звездообразование в меньшей



Иглообразные галактики

Иглообразные галактики характеризуются отсутствием ядра-утолщения, наблюдаемого в центральной части галактики.



Радиогалактики



Схема типичной Активной Галактики (N - Галактики). На схеме виден выброс плазмы из чёрной дыры, находящейся в центре галактики


**Данные галактики
обладают
мощным
радиоизлучением
и имеют заметные
угловые размеры.
Их ядра
находятся в
процессе распада.**



Радиогалактика



ОБРАЗОВАНИЕ ГАЛАКТИК



Разделение галактик на типы


Спиральная галактика


Эллиптическая галактика

Черная дыра



Изображения нашей галактики





Capital Reef National Park
(c) Wally Pacholka






a

Центр Млечного Пути

1 световой год




Пятнадцать световых лет

Десять световых лет

Пять световых лет



A black and white image of space. On the left, a small Earth is visible. In the center, a bright star or sun is shining, creating a lens flare effect. The background is filled with numerous small stars. The text "СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ" is written in a large, white, stylized font across the middle of the image.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ