

# **Основы безопасности жизнедеятельности**

## **5 класс**

# **« Оказание первой медицинской помощи при вывихе»**

**Антоненкова Анжелика Викторовна**  
**учитель ОБЖ МОУ Будинской ООШ**  
**Тверская область**

# **Сегодня вы узнаете:**

- Что такое « вывих»;
- **выясните причины возникновения вывихов, симптоматику;**
- **познакомитесь с правилами оказания ПМП при вывихе;**




**Вывих** -  
смещение  
кости из  
обычного  
положения  
в суставе.

# **Причины вывиха:**

- Чрезмерное сгибание или разгибание сустава,
- непривычное движение сустава
- падение
- сильный удар могут привести к вывиху сустава.

# Вывих плечевого сустава:



# Вывих локтевого сустава:




При вывихе  
локтевого  
сустава, а также  
при разрывах  
или отрывах  
связок следует  
проводить  
неотложное  
вправление.

# Вывих руки:



Определите, присутствует ли болевое ощущение у пострадавшего. Обратите внимание на наличие деформации сустава. Для этого необходимо сравнить сустав с аналогичным, взглянув на здоровый и поврежденный локоть, вследствие чего должно быть понятно, есть ли смещение сустава.

# ВЫВИХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ



Это стойкое смещение суставных поверхностей в височно-нижнечелюстном суставе. Вывих нижней челюсти может возникнуть при чрезмерном раскрывании рта в момент зевания, откусывании большого куска, при смехе, а также при травматических повреждениях лица.

# Вывих голеностопа:



При вывихе происходит разрыв суставной сумки и капсулы сустава, сопровождающийся повреждением связок. Основными симптомами при вывихе являются боль в конечности, резкая деформация области сустава и невозможность активных и даже пассивных движений. При вывихе конечность обычно укорочена и фиксируется в неестественном положении.

# **Вывих коленного сустава:**



**Вывих сустава коленного** является собой такое состояние, во время которого кости, которые формируют сустав, занимают неверное положение, но при этом, не повреждая их цельность.


# **ВЫВИХ КИСТИ:**



**Вывих костей  
кисти случается  
в лучезапястном  
суставе.**

# ВЫВИХ КЛЮЧИЦЫ:


Вывих ключицы достаточно распространенная травма. Подобный вывих может возникнуть вследствие падения на отведенную в сторону руку или плечо. Более редко вывих может произойти в результате резкого сжатия в поперечном направлении области надплечий.



# **Симптомы вывиха:**


- 1) Пострадавший ощущает сильную боль в области сустава,**
- 2) с трудом может двигать конечностью или она полностью неподвижна.**
- 3) Сустав имеет необычный вид,**
- 4) в области сустава имеется припухлость (по сравнению со здоровой стороной).**
- 5) пружинящая фиксация конечности при попытке придать ей физиологическое положение;**
- 6) нарушение функции сустава.**

# Оказание ПМП при вывихе:



- Нельзя пытаться вправлять вывих, т. к. это часто вызывает дополнительную травму.
- Не позволяйте пострадавшему двигать поврежденной конечностью.
- Чтобы предотвратить отек и уменьшить боль, приложите к поврежденному месту холод (пузырь со льдом или холодной водой).

# Оказание ПМП при вывихах:



- Если вывих сопровождается раной, на рану предварительно накладывают стерильную повязку. Нельзя применять согревающие компрессы.
- Как можно быстрее обеспечьте доставку пострадавшего к врачу, иначе ему будет труднее вправить вывих.

# **Подведём итог урока:**

- **Что такое вывих?**
- **При каких условиях человек может получить вывих?**
- **По каким признакам мы можем определить, что у человека вывих?**
- **Какую помощь вы окажите человеку, который получил вывих?**