




# Нуклеиновые кислоты



# ■ **Нуклеиновые кислоты**

- (от лат. *nucleus* — ядро) — высокомолекулярные органические соединения, биополимеры (**полинуклеотиды**), образованные остатками нуклеотидов



с молекулярной массой от 25 тыс. до 1 млн дальтон и более

# История открытия



**Фридрих Иоганн Мишер** (1844—1895) — швейцарский физиолог, гистолог и биолог, открыл ***нуклеины*** в 1869 г.

в клеточных ядрах, изолированных из гноя, а также из спермиев лосося.


# Значение нуклеиновых кислот

---

**Биологическая роль** заключается:

1. в хранении, реализации и передаче наследственной информации, "записанной" в виде последовательности нуклеотидов — т. н. генетического кода;
2. В управлении процессом биосинтеза белка.
  - Стабильность НК- важнейшее условие нормальной жизнедеятельности клеток и целых организмов.

# «Мы все наследники ДНК»



# НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ

**ДНК –**

**дезоксирибонуклеиновая кислота**

**сохраняют генетическую информацию**

**РНК**

**рибонуклеиновая кислота**

**участвует в передаче генетической информации**

# НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ

ДНК

МОНОМЕРЫ -  
НУКЛЕОТИДЫ

дезоксирибонуклеиновая  
кислота

РНК  
рибонуклеиновая  
кислота

## Состав нуклеотида в ДНК

**Азотистые основания:**

Аденин (А)  
Гуанин (Г)  
Цитозин (Ц)  
Тимин (Т)

Дезоксирибоза

Остаток фосфорной кислоты

Информационная (матричная) РНК (и-РНК)

Транспортная РНК (т-РНК)

Рибосомная РНК (р-РНК)

## Состав нуклеотида в РНК

**Азотистые основания:**  
Аденин (А)  
Гуанин (Г)  
Цитозин (Ц)  
Урацил (У):

Рибоза

Остаток фосфорной кислоты

7


# Нуклеиновые основания




**Пиримидин**



# Нуклеиновые основания




**Пурин**




# Пиримидиновые основания

---




**Урацил Ura**

(2,4-диоксопиримидин)



**Тимин Thy**

(5-метил-2,4-  
диоксопиримидин,  
5-метилурацил)




**Цитозин Cyt**


(4-амино-2-  
оксопиримидин)

# Пуриновые основания

---




**Аденин Ade**  
(6-аминопурин)




**Гуанин Gua**  
(2-амино-6-оксопурин)

# лактим-лактаманная таутомерия

Урацил




# лактим-лактамная таутомерия



# енамино-иминная таутомерия


Цитозин



енаминные формы

иминные формы




# Гуанин



таутомерные формы гуанина

# азольная прототропная таутомерия

Аденин







преобладает в 2,5 раза,

таутомерные формы аденина


*N-7* и *N-9*.






**Плоское строение молекул  
пиримидина и пурина**

# Производные пиримидина как лекарственные средства.



оротат калия

стимулятор обменных процессов




метилтиоурацил

функции щитовидной железы

# РНК

Урацил

Цитозин, аденин, гуанин




Урацил

# ДНК


Тимин

Цитозин, аденин, гуанин




Тимин

# гетероциклические основания




5-метилцитозин  $m^5\text{Cyt}$



дигидроурацил  $\text{UH}_2$


# Нуклеозиды *N*-гликозиды




R=OH  $\beta$ -D-рибофураноза

R=H 2-Дезокси- $\beta$ -D-рибофураноза

⚠ Природные нуклеозиды всегда являются  $\beta$ -аномерами.




Рибоза



Дезоксирибоза

# НУКЛЕОЗИДЫ



**Общая структура нуклеозида**

**$\text{R}=\text{OH}$  Рибонуклеозид**

**$\text{R}=\text{H}$  Дезоксирибонуклеозид<sup>23</sup>**

# Названия нуклеозидов

## $\beta$ -аденинрибофуранозид

### Тривиальные названия


Цитозин	+	Рибоза	Цит <b>ИДИН</b>
Цитозин	+	Дезоксирибоза	Дезоксицит <b>ИДИН</b>
Аденин	+	Рибоза	Аден <b>ОЗИН</b>
Аденин	+	Дезоксирибоза	Дезоксиаден <b>ОЗИН</b>

**Исключение**

тимидин (а не дезокситимидин)  
риботимидин




# НУКЛЕОЗИДЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ РНК (РИБОНУКЛЕОЗИДЫ)



Урацил



Уридин (U)




Цитозин

Цитидин (C)


# НУКЛЕОЗИДЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ РНК (РИБОНУКЛЕОЗИДЫ)



# НУКЛЕОЗИДЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ДНК (ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕОЗИДЫ)




# НУКЛЕОЗИДЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ДНК (ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕОЗИДЫ)



Дезоксиаденозин (dA)



Аденин



Дезоксигуанозин (dG)

Гуанин





# Необычные нуклеозиды, входящие в состав РНК (рибонуклеозиды)



ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ГИДРОЛИЗУ


# Пространственное строение нуклеозидов.

## Циклопентан




## КОНВЕРТ


## Конформации нуклеозидов



*син*-конформер  
нуклеозида  
(схематически)



*син*-уридин




*син*-гуанозин

**внутри**


***син*-конформации**

# анти-конформер


наружу



анти-конформер  
нуклеозида  
(схематически)



анти-уридин




анти-гуанозин


## В анти-конформации



# Лекарственные средства нуклеиновой природы.



5-фторурацил




6-меркаптопурин

5-фторурацил выступает в роли антагониста урацила и тимина

аденина


# НУКЛЕОТИДЫ

Нуклеотидами называют фосфаты нуклеозидов



Аденозин-5'-фосфат,  
5'-адениловая кислота


# НУКЛЕОЗИДЫ И НУКЛЕОТИДЫ




Аденозин-3'-фосфат,  
3'-адениловая кислота

## Принцип строения моноклеотидов

сложноэфирная  
связь




аденозин-5'-фосфат (5'-адениловая кислота)




аденозин-3'-фосфат (3'-адениловая кислота)

# НУКЛЕОТИДЫ



R — остаток нуклеозида



ε pH ~ 7

**Таблица 14.1. Важнейшие нуклеотиды, входящие в состав нуклеиновых кислот**

Название нуклеотидов		Сокращенное название
как фосфатов	как кислот	
Аденозин-5'-фосфат	5'-Адениловая кислота	AMP
Гуанозин-5'-фосфат	5'-Гуаниловая кислота	GMP
Цитидин-5'-фосфат	5'-Цитидиловая кислота	CMP
Уридин-5'-фосфат	5'-Уридиловая кислота	UMP
Дезоксиаденозин-5'-фосфат	5'-Дезоксиадениловая кислота	dAMP
Дезоксигуанозин-5'-фосфат	5'-Дезоксигуаниловая кислота	dGMP
Дезоксицитидин-5'-фосфат	5'-Дезоксицитидиловая кислота	dCMP
Тимидин-5'-фосфат	5'-Тимидиловая кислота	dTMP

# ОДНОБУКВЕННЫЙ КОД

5'-фосфаты записываются с добавлением латинской буквы «р» *перед* символом нуклеозида, 3'-фосфаты — *после* символа нуклеозида.


Аденозин-5'-фосфат обозначается рА

аденозин-3'-фосфат — Ар




# Циклофосфаты нуклеозидов

являются вторичными посредниками в действии полипептидных гормонов, катехоламинов и простагландинов.



Аденозин-3',5'-циклофосфат



Гуанозин-3',5'-циклофосфат

участвуют вместе с соответствующими протеинкиназами в фосфорилировании внутриклеточных белков (ферментов), изменяя их конформацию и активность.



# Структура нуклеиновых кислот


ДНК содержатся в основном в ядрах клеток

Известны три вида клеточных РНК:


- транспортная (тРНК);
- матричная (мРНК);
- рибосомная (рРНК).



# Общее строение полинуклеотидной цепи




# СТРУКТУРА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ



d(ApCpGpTp...)

d(...A—C—G—T...)



Первичная структура участка цепи ДНК

# Первичная структура нуклеиновых кислот

Первичная структура нуклеиновых кислот определяется последовательностью нуклеотидных звеньев, связанных ковалентными связями в непрерывную цепь полинуклеотида.

**набор и соотношение нуклеотидных компонентов.**

# Первичная структура нуклеиновых кислот

---

## **РНК**

Щелочной гидролиз → Рибонуклеотиды → Щелочной гидролиз →


→ Рибонуклеозиды + Фосфорная кислота

Кислотный  
гидролиз

→ Гетероциклические основания + D-Рибоза

# Вторичная структура ДНК

- это пространственная организация полинуклеотидных цепей в ее молекуле.




# Вторичная структура ДНК

---



**1953 г. Джеймс  
Уотсон и  
Френсис Крик  
(М. Уилкинс, Э.  
Чаргафф, А. Тодд,  
Л. Полинг)**




## Вторичная структура ДНК




молекула ДНК состоит из двух полинуклеотидных цепей, правозакрученных вокруг общей оси с образованием двойной спирали, имеющей диаметр 1,8 - 2,0 нм. Эти две полинуклеотидные цепи антипараллельны друг другу, т.е. направления образования фосфодиэфирных связей в них противоположны: в одной цепи 5' - 3', в другой 3' - 5'.

На каждый виток спирали приходится 10 пар оснований.





# Вторичная структура нуклеиновых кислот




**Вертикальные взаимодействия между соседними основаниями, располагающимися друг над другом в виде стопок- **СТЭКИНГ-ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ****

два типа электронных эффектов – лондоновские дисперсионные силы (обусловленные индуцированными диполями) и взаимодействие между постоянными диполями дают весьма заметный эффект.


# Гидрофобные силы

---


- Если растворенные молекулы агрегируют друг с другом, то суммарная поверхность, контактирующая с водой, уменьшается. Это приводит к высвобождению молекул структурированной воды, к увеличению ее энтропии и к стабилизации агрегатов.



# Водородные связи




Пурин



Пиримидин




Данный вид взаимодействия называют "поперечным"






## ■ Комплементар- НОСТЬ

(от лат. complementum — дополнение) — пространственная взаимодополняемость молекул или их частей, приводящая к образованию водородных связей. Комплементарные структуры подходят друг к другу как ключ к замку. **Комплементарный — дополняющий.**



# Водородные связи между комплементарными основаниями




Тимин

Аденин

1,11 нм 54

# Водородные связи



пара ГЦ связана несколько прочнее и более компактна

# Правила Чаргаффа


---

- 1) количество пуриновых оснований равно количеству пиримидиновых оснований;
- 2) количество аденина равно количеству тимина;  
количество гуанина равно количеству *цитозина*;
- 3) количество оснований, содержащих аминогруппу в положениях 4 пиримидинового и 6 пуринового ядер, равно количеству оснований, содержащих в этих же положениях оксогруппу. Это означает, что сумма аденина и цитозина равна сумме гуанина и тимина.




# Классическая двойная спираль Уотсона-Крика получила название **B-формы ДНК**.

B-форма




[www.visualscience.ru](http://www.visualscience.ru)



- Угол вращения -  $36^\circ$
- Оснований на виток – 10
- Правозакручена

При дегидратации В-формы образуется **А-форма** ДНК-правозакрученная двойная спираль, содержащая в одном витке ок. 11 остатков нуклеотидов, плоскости гетероциклич. оснований повернуты примерно на  $20^\circ$  относительно перпендикуляра к оси спирали.

А-форма




[www.visualscience.ru](http://www.visualscience.ru)





- Угол вращения -  $32^\circ$
- Оснований на виток – 11
- Правозакручена

При изменении ионной силы и состава растворителя двойная спираль изменяет свою форму и даже может превращаться в левозакрученную спираль (**Z-форма**)

Z-форма



www.visualscience.ru




- Угол вращения -  $60^\circ$
- Оснований на виток – 12
- Левозакручена




# Роль комплементарных взаимодействий в осуществлении биологической функции ДНК.

## Мутации

Комплементарная пара не образуется




Тимин  
(лактаменная форма)



Гуанин


**сдвиг таутомерного равновесия.**

# Мутации




**замена пары оснований на другую**

# Мутации под воздействием химических факторов



аденозин  
(R — остаток рибозы)



инозин

гипоксантин

·ЦИТОЗИН

# Третичная структура ДНК.




схема многостадийной упаковки молекулы ДНК в хромосому

У человека ДНК клетки организовано в 23 пары хромосом. Средняя протяженность ДНК хромосомы, включающая 130 млн. пар оснований, имеет среднюю длину 5 см.

---

- Многократная спирализация ДНК, сопровождающаяся образованием комплексов с белками, и представляет собой ее **третичную структуру**
- Фибриллы хроматина представляют собой структуры, напоминающие **бусы на нитке**: небольшие, около 10 нм глобулы, связанные друг с другом отрезками ДНК длиной около 20 нм. Эти глобулы получили название **нуклеосом**





- нить плотно упакованных **нуклеосом** диаметром 10 нм, образует в свою очередь спиральные витки с шагом спирали около 10 нм. На один виток такой суперспирали приходится 6-7 нуклеосом.

Такие 25-30-нанометровые глобулы получили название **нуклеомеров** или **«сверхбусин»**. Нуклеомерный уровень укладки хроматина обеспечивает 40-кратное уплотнение ДНК.

- встречаются **положительные и отрицательные супервитки**, образованные за счет скручивания по часовой или против часовой стрелки двойной спирали ,

специфическое связывание с белками приводит к дальнейшему формированию в этих участках **больших петель или доменов**

# ДНК В СОСТАВЕ ХРОМОСОМ



# СТРУКТУРА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ


---



**Модель нити ДНК  
толщиной 30  
миллионных частей  
миллиметра.  
Изображение  
*Nature***

# СТРУКТУРА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

---




**Нуклеосома, первый уровень упаковки.**

Двойная спираль ДНК дважды огибает комплекс гистонных протеинов. Точное положение уплотнительного протеина H1 требует еще уточнения.

Иллюстрация Матиас Бадер (Mathias Bader)

# СТРУКТУРА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ


---



**Второй уровень упаковки.** Вопреки тому, что полагали до сих пор, структура «жемчужного ожерелья» ДНК закручивается не в форме спиралевидной структуры (а), а в форме зигзага (b).  
Изображения *Science*


# СТРУКТУРА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

---



**Структура тетрануклеосомы, определенная командой Тима Ричмонда, показывает, что две нуклеосомы, сложенные одна в другую, соединены с двумя другими нуклеосомами, расположенными напротив, посредством прямой нити ДНК. Эти две кипы соответственно сложены в противоположном направлении.**


**Репликация** – процесс самоудвоения молекулы ДНК на основе принципа комплементарности.



**Значение репликации:** благодаря самоудвоению ДНК, происходят процессы деления клеток.



# Репликация ДНК



# РЕПЛИКАЦИЯ ДНК

**Таблица. Параметры некоторых молекул ДНК**

Организм	Число пар оснований	Контурная длина, см	Молекулярная масса, млн.
Вирус SV40	5 100	$1,7 \cdot 10^{-4}$	3.4
Бактериофаг Т4	110 000	$3,7 \cdot 10^{-3}$	73
Бактерия <i>E. coli</i>	4 000 000	0.14	2600
Дрозофила	165 000 000	5,6	$1,1 \cdot 10^{-5}$
Человек	2 900 000 000	100	$1,9 \cdot 10^{-6}$

# РЕПЛИКАЦИЯ ДНК

---



---

**Таблица. Параметры молекул РНК бактерии *E. coli***

<b>Тип РНК</b>	<b>Число оснований</b>	<b>Молекулярная масса, тыс.</b>
<b>Рибосомная</b>		
<b>23S</b>	<b>3700</b>	<b>1200</b>
<b>16S</b>	<b>1700</b>	<b>550</b>
<b>5S</b>	<b>120</b>	<b>36</b>
<b>Транспортная</b>	<b>75</b>	<b>25</b>
<b>Информационная</b>	<b>1200 (средн.)</b>	<b>390 (средн.)</b>


# ВИДЫ РИБОНУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

- транспортная РНК (т-РНК),  
информационная РНК (и-РНК),  
рибосомная РНК (р-РНК).




# т-РНК

- На долю приходится 10-20% от суммы клеточных РНК; их молекулярная масса 30.000, цепь включает 75-90 нуклеотидных звеньев. Основная роль т-РНК состоит в том, что они транспортируют аминокислоты из цитоплазмы к месту синтеза белка – в рибосомы. Число т-РНК превышает число  $\alpha$ -аминокислот, участвующих в построении белков.




Структура «клеверного листа» тРНК

# СТРУКТУРА тРНК



# СТРУКТУРА РНК


---



**Схема двухцепочечного участка РНК**




# СТРУКТУРА РИБОСОМАЛЬНОЙ РНК




**A. Вторичная структура и доменная организация рибосомальной 16S РНК *T. Thermophilus*. 5'-домен обозначен синим цветом, центральный — фиолетовым, 3'-major — красным и 3'-minor — желтым. Спиральные участки пронумерованы от 1 до 45.<sup>81</sup>**

# СТРУКТУРА РИБОСОМАЛЬНОЙ РНК



**В. Вторичная структура и доменная организация 16S и 5S РНК *T. Thermophilus*. Шесть доменов обозначены разными цветами. спиральные участки пронумерованы от 1 до 101.**


# СТРУКТУРА РИБОСОМАЛЬНОЙ РНК




**C. Трехмерная структура рРНК малой субъединицы. Цвет доменов соответствует рис. А. Домены образуют отдельные блоки укладки.**

**D. Трехмерная структура рРНК большой субъединицы. Цвет доменов соответствует рис.В. В процессе укладки (фолдинга) домены сильно переплетаются друг с другом.**

# Аденозинтрифосфат (АТФ)



# Аденозинтрифосфат (АТФ)




ангидридная (макроэргическая) связь


При расщеплении макроэргической связи  $\text{P} \sim \text{O}$  выделяется  $\sim 32$  кДж/моль. С этим связана важнейшая роль АТФ как «поставщика» энергии во всех живых клетках. Нуклеозидная часть молекулы важна для узнавания и связывания с различными ферментами, использующими АТФ или ГТФ.

# Нуклеозидполифосфаты в биохимических процессах

---




сложный эфир



смешанный ангидрид



# Нуклеозидполифосфаты в биохимических процессах

---




Получение фосфатов гидроксилсодержащих соединений :

# Нуклеозидполифосфаты в биохимических процессах






# Нуклеозидполифосфаты в биохимических процессах




Глутамат

нуклеофильная атака



Глутамин



# БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

---



***1. Информационная, или матричная РНК (ее обозначают мРНК) считывает и переносит генетическую информацию от ДНК, содержащейся в хромосомах, к рибосомам, где происходит синтез белка со строго определенной последовательностью аминокислот.***

# БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

---

ДНК  $\xrightarrow{\text{Транскрипция}}$  РНК  $\xrightarrow{\text{Трансляция}}$  Белок

ДНК	мРНК
адени н	ураци л
тимин	адени н
гуани н	цитоз ин
цитоз ин	гуани н

# БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ




---

**2. Транспортная РНК (тРНК) переносит аминокислоты к рибосомам, где они соединяются пептидными связями в определенной последовательности, которую задает мРНК.**


**3. Рибосамная РНК (рРНК) непосредственно участвует в синтезе белков в рибосомах.**

**Рибосомы** — это сложные надмолекулярные структуры, которые состоят из четырех рРНК и нескольких десятков белков.

# Транскрипция



# Трансляция




# БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

## Таблица. Генетический код

Кодон	Аминокислота	Кодон	Аминокислота	Кодон	Аминокислота	Кодон	Аминокислота	
UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys	
UUC		UCC		UAC		UGC		
UUA	Leu	UCA		UAA	-	UGA	-	
UUG		UCG		UAG		UGG	Trp	
CUU		Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg
CUC			CCC		CAC		CGC	
CUA	CCA		CAA		Gln	CGA		
CUG	CCG		CAG			CGG		
AUU	Ile	ACU	Thr	AAU	Asn	AGA		
AUC		ACC		AAC		AGG		
AUA		ACA		AAA	Lys	AGU	Ser	
AUG	Met	ACG		AAG		AGC		
GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly	
GUC		GCC		GAC		GGC		
GUA		GCA		GAA	Glu	GGA		
GUG		GCG		GAG		GGG		


# Передача наследственной информации от ДНК к и-РНК и к белку





# Центральная догма (основной постулат) молекулярной биологии – матричный синтез.

## Этапы биосинтеза белка:



# Николай Константинович Кольцов (1872-1940)




Отечественный зоолог,  
цитолог, генетик.

Выдвинул идею о том, что  
синтез белка идет


**по матричному  
принципу.**

# Строение рибосомы: 1 — большая субъединица, 2 — малая субъединица


- Рибосомы - очень мелкие органонды клетки, образованные рибонуклеиновыми кислотами и белками.
- Каждая рибосома состоит из двух частиц - малой и большой.
- Основной функцией рибосом является синтез белков.



# Биосинтез белка




*Трансляция – перевод последовательности нуклеотидов в последовательность аминокислот белка.*




**Антикодон– триплет нуклеотидов на вершущке tPHK.**  
**Кодон– триплет нуклеотидов на и-РНК.**


*Водородные связи между  
комплементарными нуклеотидами*



*мРНК*




*Пептидная  
связь*





103

## *И-РНК на рибосомах*







Полисома из печени содержит 12 рибосом, которые выглядят темными пятнами. А цепочка иРНК на снимке не видна.

На одной и-РНК «работают» несколько рибосом. Такой комплекс называется **полисома**. После завершения синтеза иРНК распадается на нуклеотиды.

Весь цикл процессов, связанных с синтезом одной белковой молекулы, занимает в среднем 1-3 с.

# Спасибо!!!



\*

# БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ



---

---

неперекрывающийся код




перекрывающийся код





Thr — Tyr — Arg — Ser — Gly — Cys


# Нуклеозидполифосфаты в биохимических процессах



# Нуклеозидполифосфаты в биохимических процессах




# Никотинамиднуклеотиды



R=H      Никотинамидадениндинуклеотид (НАД<sup>+</sup>)


R=PO<sub>3</sub>H<sub>2</sub>      Никотинамидадениндинуклеотидфосфат (НАДФ<sup>+</sup>)

# Никотинамиднуклеотиды



# Никотинамиднуклеотиды


---



**Энантиотопные атомы H<sub>a</sub> (про-R) и H<sub>b</sub> (про-S) в молекуле НАДН**




# Никотинамиднуклеотиды



НАД<sup>+</sup>

R-1-дейтероэтанол

НАДH




НАД<sup>+</sup>

S-1-дейтероэтанол

НАДH


113

# Никотинамиднуклеотиды




**Стереоспецифичность окислительно-восстановительной реакции с участием кофермента.**

# Никотинамиднуклеотиды




# Никотинамиднуклеотиды





# Никотинамиднуклеотиды

---



ФАД  
(окисленная форма)



ФАДН<sub>2</sub>  
(восстановленная форма)

Спасибо

за внимание!

