


# Наша Галактика

Проект Вахромовой Алены (11 класс),  
Закировой Гульназ (11 класс)

Одним из самых примечательных объектов звездного неба является Млечный Путь. Древние греки называли его «молочный круг». Уже первые наблюдения в телескоп проведенные Галилеем, показали, что Млечный Путь – это скопление очень далеких и слабых звезд.






Особенно эффектно выглядит Млечный Путь в южном полушарии

Южная часть Млечного Пути


В начале 20 века стало очевидным, что почти все видимое вещество во Вселенной сосредоточено в гигантских звездно-газовых островах с характерным размером от нескольких парсеков до нескольких десятков килопарсеков

Солнце вместе с окружающими его звездами также входят в состав спиральной галактики, всегда обозначаемой с заглавной буквы: Галактика. Когда мы говорим о Солнце, как об объекте Солнечной системы, мы тоже пишем его с большой буквы



Галактика состоит из диска, гала и короны. Центральная, наиболее компактная область Галактики называется ядром. Центральная, наиболее плотная часть гала в пределах нескольких тысяч световых лет от центра Галактики называется балдж.

Галактика излучает во всех диапазонах электромагнитного излучения



Млечный Путь в различных диапазонах длин волн

Распределение звезд в Галактике имеет две ярко выраженные особенности :очень высокую концентрацию звезд в галактической плоскости и большую концентрацию в центре Галактики



Примерно так выглядит наша Галактика сбоку

Примерно так выглядит наша Галактика сверху



В Галактике каждая третья звезда -двойная, имеются системы из трех и более звезд.

Известны и более сложные объекты -звездные скопления.

Рассеянные звездные скопления встречаются вблизи галактической плоскости



Рассеянное скопление M50 в созвездии Единорога

Рассеянные скопления состоят из сотен или тысяч звезд.  
Их масса невелика (100-1000 масс Солнца)



Рассеянное скопление Плеяды

Шаровые скопления сильно выделяются на звездном фоне благодаря значительному числу звезд и четкой сферической форме. Диаметр шаровых скоплений составляет от 20 до 100 пк.




Шаровое скопление в созвездии  
Центавра

Подводные кораллы? Очарованные замки? Космические змеи?  
В действительности эти таинственные темные колонны -очень  
плотные газопылевые облака туманности M16 Орел в созвездии  
Змеи



Большая туманность Ориона. Это диффузная туманность





Центральная часть Туманности Ориона

A deep space photograph of the Flame Nebula (NGC 2024). The nebula is a large emission nebula located in the constellation Orion. It is characterized by its reddish-orange glow, which is caused by the ionization of hydrogen gas by the intense ultraviolet radiation from the young stars within the nebula. The nebula is set against a dark, star-filled background of the interstellar medium.

Туманность Курительная Трубка


## Планетарная туманность Кошачий Глаз



## Планетарная туманность Эскимос



## Круговорот газа и пыли в Галактике



Темная туманность Конская Голова



# Схема расположения Туманности Конская Голова

Туманность  
Конская  
Голова

Трехраздельная-  
туманность



Планетарная туманность в созвездии Лиры



Центр Галактики в инфракрасных лучах

Вращение Галактики происходит по часовой стрелке, если смотреть на Галактику со стороны ее северного полюса, находящегося в созвездии Волосы Вероники. Угловая скорость вращения зависит от расстояния от центра и убывает по мере удаления от центра. Солнце движется со скоростью 200 км \c вокруг центра Галактики и делает полный оборот вокруг центра за 220 миллионов лет



# Карта Млечного Пути

