

Лесостепь



Презентацию создал:
Ученик 8 класса «Б»
АМОУСОШ №4
Города Асбеста
Свердл.Обл
Матяж Денис

Для лесостепи характерны *пестрота почв и сочетание междуречных лесных ландшафтов со степными*. В лесной растительности европейской лесостепи преобладают дубравы с примесью липы, ясеня, клена, в западносибирской - березовые рощи (колки) с примесью сосны и лиственницы. (Ель в лесостепной полосе отсутствует.) В лесах развиваются серые лесные почвы, а в разнотравных степях — черноземы.



В настоящее время основные участки лесостепи распаханы и превращены в сельскохозяйственные угодья, где выращивают зерновые культуры, свеклу, подсолнечник, картофель, кукурузу, виноград (на западе). Кроме полеводства, в этих районах развиты садоводство и огородничество.



К югу от лесостепной зоны расположена полоса степей, которая представляет собой обширные безлесные просторы с менее выраженным, чем в лесостепи, расчленением рельефа. Так как в степях для развития древесной растительности не хватает в почве влаги, то поверхность этой зоны покрыта в основном травами, а небольшие рощи и заросли кустарников встречаются только около рек, кое-где в оврагах, где уровень грунтовых вод достаточно высок.



Климат степей

континентальный, особенно в восточной части. *Лето более продолжительное и жаркое*, чем в лесостепной и лесной зонах. Средняя температура июля $+22 \dots +23,5^{\circ}\text{C}$ (жара местами достигает $+40^{\circ}\text{C}$). Относительная влажность воздуха летом бывает; около 40—50%. Погода стоит сухая, солнечная. Дожди обычно имеют ливневый характер, вследствие чего бурные потоки воды, стекающие в низины, не успевают просочиться в почву и быстро испаряются.



Россия





С.Ш.А.

www.ecosystema.ru

Животный мир лесостепи также образует смесь лесных видов со степными. В лесных районах водятся лесная куница, белка, соня: изредка встречаются лоси и косули, а в степных — суслики, земляной заяц, сурок-байбак, степной хорь, изредка — дрофа и стрепет. В реках — речной бобр и выхухоль.



Коне

ц