

Растения пустыни

Бабак Маргарита

Пустыни

Пустыни

Песчаные

Каменистые

Глинистые

Песчаные пустыни

- Более благоприятны для развития растительности, в песках на разной глубине есть грунтовые воды.
- Пески легко перевеваются ветром, если они не закреплены растительностью. Но в основном песчаные пустыни неподвижны. Горы песка называются барханами



Каменистые пустыни

- Располагаются на возвышенности. Скалы под действием ветра растрескиваются, ветер выносит из трещин и сдувает тонкий материал, скалы приобретают причудливые формы.



Глинистые пустыни

- Тоже растрескиваются из-за палящего солнца и недостатка воды, а ветер ещё усиливает эти трещины.
- Ветер практически постоянный спутник пустыни. Иногда он достигает огромной силы и движется с огромной скоростью. Тогда возникает одно из самых страшных явлений пустыни – песчаные бури – смерчи





- В пустыне есть травы, кустарники и даже деревья. Все они по-разному борются с недостатком воды. Есть среди них такие, которые научились жить особой, ускоренной жизнью. Весной они пёстрым ковром устилают пустыни, а как только летний зной высосет из почвы всю влагу, они умирают.

Верблюжья колючка

- Невысокие сильно ветвистые полукустарники или многолетние травы. В пазухах листьев на колючках сидят красные или розовые цветки.



Колосняк

- Многолетние травы, большей частью с ползучими корневищами и жёсткими листьями. Колоски сидят на колосьях группами по 2—6, реже по 1. Солевыносливые и засухоустойчивые растения. Некоторые имеют кормовое значение. Многие виды — хорошие закрепители песков.



Джузгун

- Джузгун интересен прежде всего тем, что он выглядит совершенно безлистным. Кажется, что кустарник состоит только из одних ветвей — более толстых и более тонких. Но на самом деле листья у растения есть. Правда, они очень мелкие и малозаметные, функции листьев выполняют тонкие зеленые веточки, которые появляются на растении каждую весну.



Саксаул

- Кустарники или небольшие деревья (высотой 1,5 - 12 м). Корневая система мощная, уходящая в почву иногда до 10 - 11 м. Листья в виде мелких бесцветных чешуи или бугорков (фотосинтез осуществляют зелёные ветви).



Эфедра

- Сильно ветвистый кустарник высотой до 1 м.
- Функция фотосинтеза переходит к молодым ветвям.



Ферула каспийская

- Многолетние травы с желтыми или зеленоватыми цветами. Около 50 видов, распространенных, главным образом, в Средней Азии.



Спасибо за внимание!