

Вектор

Вектор – отрезок, для которого
указано,
какой из его концов считается
началом,
а какой – концом.


Обозначение векторов:

A  B



A

B


 \vec{t}

Нулевой
вектор:

C.



C

C

Типы векторов:

Векторы


Коллинеарные

Неколлинеарные




Сонаправленные

Противоположно-
направленные

Коллинеарные вектора:





Неколлинеарные вектора:





Сонаправленные вектора:

- Сонаправленные вектора – коллинеарные вектора, направленные в одну сторону.



Противоположнонаправленные вектора:

- Противоположнонаправленные вектора – коллинеарные вектора, направленные в противоположные стороны.



Сложение векторов




Сложение:

Правило треугольника

Правило параллелограмма

Правило сложения треугольника:

- $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$;
- $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$



$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{OA} + \vec{AB} = \vec{OB}$$


Правило параллелограмма:

- $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$

(переместительный закон)


- $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$

(сочетательный закон)



$$\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC}$$


Сумма нескольких векторов:



$$\vec{p} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} + \vec{e} + \vec{f}$$

Разность векторов:


Для любых векторов \vec{a} и \vec{b} справедливо равенство :
 $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$



$$\vec{AB} - \vec{AC} = \vec{CB}$$

Умножение вектора на число:

1. $(kl) \cdot \vec{a} \cong k \cdot (l\vec{a})$ (сочетательный закон)
2. $(k + l) \cdot \vec{a} \cong k\vec{a} \mp l\vec{a}$ (первый распределительный закон)
3. $k(\vec{a} \mp \vec{b}) \cong k\vec{a} \mp k\vec{b}$ (второй распределительный закон)
4. k, l – числа ; \vec{a}, \vec{b} – вектора



$\vec{b} = k\vec{a}$, где k – число, $\vec{a} \neq \vec{0}$

$\vec{b} \uparrow \uparrow \vec{a}$, если $k > 0$

$\vec{b} \uparrow \downarrow \vec{a}$, если $k < 0$

$$|\vec{b}| = |k| \cdot |\vec{a}|$$

Автор
Шинарёв Роман
9 «В» класс
2007г.



Учитель геометрии
Володина Марина Викторовна