




функция чётная  
 $\max_{x \in \mathbb{R}} f(x) = f(0) = 4$   
 $\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) = f(-4) = -5$   
 $f'(x) = 0$  при  $x = 0$ ;  $x = 4$



$\max_{x \in \mathbb{R}} f(x) = f(0) = 4$   
 $f(x) > 0$  при любом  $x \in (-\infty; +\infty)$   
 $f'(x) = 0$  если  $x = 0$   
 $f'(x)$  не существует  
 при  $x = 5$ ;  $x = -5$







функция чётная  
 $f'(x)$  не существует  
 при  $x = 5$ ;  $x = -5$   
 $\max_{x \in \mathbb{R}} f(x) = f(0) = 3$



$f(x) = 0$ ; при  $x = -2$ ;  $x = 5$ ;  $x = 9$   
 $f'(x) < 0$  для любого  $x \in (3; 7)$   
 $f'(x) = 0$  при  $x = 3$ ;  $x = 7$

Литвиненко Т.Н. преподаватель математики  
 ГОУНПО профессионального училища №6  
 Благовещенск

**№ 1****№ 2****№ 3****№ 4**

**с**

$$D(x) \quad x \in (-\infty; +\infty)$$

$$f'(x) < 0 \text{ при любом } x \in (-\infty; -4) \cup (0; 4)$$

$$f'(x) > 0 \text{ при любом } x \in (-4; 0) \cup (4; +\infty)$$

**и**

$$\max_{[-5; 5]} f(x) = f(0) = 3$$

$$f(x) > 0 \text{ при любом } x \in (-\infty; +\infty)$$

$$f'(x) = 0 \text{ если } x = 0$$

$$f'(x) \text{ не существует}$$

$$\text{при } x = 5; \quad x = -5$$

**л**

*нечётная*

$$\max_{[-1; 1]} f(x) = f(1) = 4;$$

$$\min_{(-\infty; -1]} f(x) = f(-1) = -4$$

$$f'(x) \text{ не существует}$$

$$\text{при } x = 1; \quad x = -1$$

**а**

$$D(x) \quad x \in [-2; 9]$$

$$f'(x) < 0 \text{ для любого } x \in (3; 7)$$

$$f'(x) > 0 \text{ для любого } x \in (-2; 3) \cup (7; 9)$$

**В**

*функция четная*

$$\max_{[-4;4]} f(x) = f(0) = 4$$

$$\min_{(-\infty; -4]} f(x) = f(-4) = -5$$

$$f'(x) = 0 \text{ при } x = 0; x = 4$$

**У**

*функция чётная*

*$f'(x)$  не существует*

*при  $x = 5; x = -5$*

$$\max_{[-5;5]} f(x) = f(0) = 3$$

**М**

$$D(x) \quad x \in (-\infty; +\infty)$$

*$f'(x) < 0$  при любом  $x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$*

*$f'(x) > 0$  при любом  $x \in (-1; 1)$*


**е**

$$f(x) = 0; \text{ при } x = -2; x = 5; x = 9$$

*$f'(x) < 0$  для любого  $x \in (3; 7)$*

$$f'(x) = 0 \text{ при } x = 3; x = 7$$

№ 1



I вариант

Буква **С**

II вариант

Буква **В**

$$D(x) \quad x \in (-\infty; +\infty)$$

$$f'(x) < 0 \quad \text{при любом } x \in (-\infty; -4) \cup (0; 4)$$

$$f'(x) > 0 \quad \text{при любом } x \in (-4; 0) \cup (4; +\infty)$$


*функция четная*

$$\max_{[-4; 4]} f(x) = f(0) = 4$$

$$\min_{(-\infty; -4]} f(x) = f(-4) = -5$$

$$f'(x) = 0 \quad \text{при } x = 0; \quad x = 4$$

## № 2



I вариант

Буква **И**

$$\max_{[-5;5]} f(x) = f(0) = 3$$

$f(x) > 0$  при любом  $x \in (-\infty; +\infty)$

$f'(x) = 0$  если  $x = 0$

$f'(x)$  не существует

при  $x = 5; x = -5$

II вариант

Буква **У**


*функция чётная*

*$f'(x)$  не существует*

*при  $x = 5; x = -5$*

$$\max_{[-5;5]} f(x) = f(0) = 3$$

# № 3



*нечётная*

$$\max_{[-1;1]} f(x) = f(1) = 4;$$

$$\min_{(-\infty;-1]} f(x) = f(-1) = -4$$


*f'(x) не существует при x = 1; x = -1*

$$D(x) \quad x \in (-\infty; +\infty)$$

$$f'(x) < 0 \text{ при любом } x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$$

$$f'(x) > 0 \text{ при любом } x \in (-1; 1)$$

# № 4



I вариант

Буква **A**

II вариант

Буква **E**

$$D(x) \quad x \in [-2; 9]$$

$$f'(x) < 0 \quad \text{для любого } x \in (3; 7)$$

$$f'(x) > 0 \quad \text{для любого } x \in (-2; 3) \cup (7; 9)$$





$$f(x) = 0; \quad \text{при } x = -2; \quad x = 5; \quad x = 9$$

$$f'(x) < 0 \quad \text{для любого } x \in (3; 7)$$

$$f'(x) = 0 \quad \text{при } x = 3; \quad x = 7$$

# Сложилась фраза

I  
вариант



II  
вариант

