




функция чётная
 $\max_{x \in \mathbb{R}} f(x) = f(0) = 4$
 $\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) = f(-4) = -5$
 $f'(x) = 0$ при $x = 0$; $x = 4$



$\max_{x \in \mathbb{R}} f(x) = f(0) = 3$
 $f(x) > 0$ при любом $x \in (-\infty; +\infty)$
 $f'(x) = 0$ если $x = 0$
 $f'(x)$ не существует
 при $x = 5$; $x = -5$







функция чётная
 $f'(x)$ не существует
 при $x = 5$; $x = -5$
 $\max_{x \in \mathbb{R}} f(x) = f(0) = 3$



$f(x) = 0$; при $x = -2$; $x = 5$; $x = 9$
 $f'(x) < 0$ для любого $x \in (3; 7)$
 $f'(x) = 0$ при $x = 3$; $x = 7$

Литвиненко Т.Н. преподаватель математики
 ГОУНПО профессионального училища №6
 Благовещенск

№ 1**№ 2****№ 3****№ 4**

с

$$D(x) \quad x \in (-\infty; +\infty)$$

$$f'(x) < 0 \text{ при любом } x \in (-\infty; -4) \cup (0; 4)$$

$$f'(x) > 0 \text{ при любом } x \in (-4; 0) \cup (4; +\infty)$$

и

$$\max_{[-5; 5]} f(x) = f(0) = 3$$

$$f(x) > 0 \text{ при любом } x \in (-\infty; +\infty)$$

$$f'(x) = 0 \text{ если } x = 0$$

$$f'(x) \text{ не существует}$$

$$\text{при } x = 5; \quad x = -5$$

л

нечётная

$$\max_{[-1; 1]} f(x) = f(1) = 4;$$

$$\min_{(-\infty; -1]} f(x) = f(-1) = -4$$

$$f'(x) \text{ не существует}$$

$$\text{при } x = 1; \quad x = -1$$

а

$$D(x) \quad x \in [-2; 9]$$

$$f'(x) < 0 \text{ для любого } x \in (3; 7)$$

$$f'(x) > 0 \text{ для любого } x \in (-2; 3) \cup (7; 9)$$

В

функция четная

$$\max_{[-4;4]} f(x) = f(0) = 4$$

$$\min_{(-\infty; -4]} f(x) = f(-4) = -5$$

$$f'(x) = 0 \text{ при } x = 0; x = 4$$

У

функция чётная

$f'(x)$ не существует

при $x = 5; x = -5$

$$\max_{[-5;5]} f(x) = f(0) = 3$$

М

$$D(x) \quad x \in (-\infty; +\infty)$$

$f'(x) < 0$ при любом $x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$

$f'(x) > 0$ при любом $x \in (-1; 1)$


е

$$f(x) = 0; \text{ при } x = -2; x = 5; x = 9$$

$f'(x) < 0$ для любого $x \in (3; 7)$

$$f'(x) = 0 \text{ при } x = 3; x = 7$$

№ 1



I вариант

Буква **С**

II вариант

Буква **В**

$$D(x) \quad x \in (-\infty; +\infty)$$

$$f'(x) < 0 \quad \text{при любом } x \in (-\infty; -4) \cup (0; 4)$$

$$f'(x) > 0 \quad \text{при любом } x \in (-4; 0) \cup (4; +\infty)$$


функция четная

$$\max_{[-4; 4]} f(x) = f(0) = 4$$

$$\min_{(-\infty; -4]} f(x) = f(-4) = -5$$

$$f'(x) = 0 \quad \text{при } x = 0; \quad x = 4$$

№ 2



I вариант

Буква **И**

$$\max_{[-5;5]} f(x) = f(0) = 3$$

$f(x) > 0$ при любом $x \in (-\infty; +\infty)$

$f'(x) = 0$ если $x = 0$

$f'(x)$ не существует

при $x = 5; x = -5$

II вариант

Буква **У**


функция чётная

$f'(x)$ не существует

при $x = 5; x = -5$

$$\max_{[-5;5]} f(x) = f(0) = 3$$

№ 3



нечётная

$$\max_{[-1;1]} f(x) = f(1) = 4;$$

$$\min_{(-\infty;-1]} f(x) = f(-1) = -4$$


f'(x) не существует при x = 1; x = -1

$$D(x) \quad x \in (-\infty; +\infty)$$

$$f'(x) < 0 \text{ при любом } x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$$

$$f'(x) > 0 \text{ при любом } x \in (-1; 1)$$

№ 4



I вариант

Буква **A**

II вариант

Буква **E**

$$D(x) \quad x \in [-2; 9]$$

$$f'(x) < 0 \quad \text{для любого } x \in (3; 7)$$

$$f'(x) > 0 \quad \text{для любого } x \in (-2; 3) \cup (7; 9)$$





$$f(x) = 0; \quad \text{при } x = -2; \quad x = 5; \quad x = 9$$

$$f'(x) < 0 \quad \text{для любого } x \in (3; 7)$$

$$f'(x) = 0 \quad \text{при } x = 3; \quad x = 7$$

Сложилась фраза

I
вариант



II
вариант

