

# Механические колебания

11 класс



- Механические колебания — это движения, которые точно или приблизительно повторяются через определенные интервалы времени




- По характеру физических процессов в системе, которые вызывают колебательные движения, различают три основных вида колебаний:

**свободные**


**вынужденные**

**автоколебания**

- **Вынужденные колебания** – это колебания, которые происходят под действием внешней, периодически изменяющейся силы.



- **Свободные колебания** – это колебания, которые возникли в системе под действием внутренних сил, после того, как система была выведена из положения устойчивого равновесия.



- Автоколебаниями маятниковые часы называются незатухающие колебания, которые могут существовать в системе без воздействия на неё внешних периодических сил.



Маятниковые часы





Часы с балансиrom.



Спусковой механизм часов:

- 1 — балансиr;
- 2 — анкерная вилка;
- 3 — спусковое колесо

# Колебательные системы



# Колебательные системы









# Условия возникновения колебаний




# Преобразование энергии при колебательном движении



- В неустойчивом равновесии имеем

$$E_{\Pi} \text{ --- } E_{\text{к}} \text{ --- } E_{\Pi} \text{ --- } E_{\text{к}} \text{ --- } E_{\Pi}$$


- 
- За полное колебание (колебательное движение, которое вновь повторяется, называют полным колебанием)

$$mgh_{\max} = \frac{mV_1^2}{2} + mgh_1 = \frac{mV_{\max}^2}{2} = \text{const}$$


- Выполняется закон сохранения энергии.
- 

# Параметры колебательного движения

- Смещение  $x$  – отклонение колеблющейся точки от положения равновесия в данный момент времени.




- Амплитуда  $x_{\max}$  или  $A$  – наибольшее смещение от положения равновесия.




- Период  $T$  – время одного полного колебания. Выражается в секундах.
- Частота  $\nu$  – число полных колебаний за единицу времени. Выражается в герцах(Гц).

$$T = \frac{1}{\nu}$$

$$\nu = \frac{N}{t}$$

- 
- Циклическая (круговая) частота колебаний – частота , равная числу колебаний , совершаемых материальной точкой за  $\frac{2\pi}{\epsilon}$


$$\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$$


# Свободные колебания пружинного маятника

- $F_x = -kx$  – закон Гука
- $F_x = ma_x$  – второй закон Ньютона
- $ma_x = -kx$ ,  $a_x = -kx/m$ ,  $k/m = \text{const}$


$$a_x = -\frac{k}{m}x$$

уравнение свободных колебаний пружинного маятника.





- Ускорение тела, колеблющегося на пружине, не зависит от силы тяжести, действующей на это тело, но пропорционально смещению и направлено в сторону равновесия.





# Домашнее задание

- Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков

Физика 11 класс

Колебания и волны

Параграфы 1.1 – 1.2

