

# *Валентные состояния атома углерода*


**Пивкина**

**Лариса Анатольевна**

**МОУ «Сугоякская СОШ»**




***Первое валентное состояние атома  
углерода (на  
примере молекулы метана)***



**Два «противоречия» в строении метана:**

**1 противоречие:**

**Валентность углерода равна четырем  в наличии только 2 валентных электрона**

**Решение:**

**Выход в возбужденное состояние атома углерода**

**2 противоречие:**

**В молекуле все четыре связи  
одинаковые →  
по теории – одна SS связь и три SP связи**

**Решение:**

**$SP^3$  гибридизация**

**Гибридизация** – изменение формы и энергии различных орбиталей одного атома, приводящее к образованию одинаковых (гибридных) орбиталей


**Виды  
гибридизации**

**3  
SP**

**2  
SP**

**SP**

# Второе валентное состояние атома углерода (на примере молекулы этилена)



Атомы углерода в молекуле этилена образуют двойную связь, находятся в состоянии **SP<sup>2</sup>** гибридизации

# Связи в этилене неравноценны:



(сигма) – более прочная



(пи) – легче рвется, более реакционноспособна, плотность электронного облака максимально сконцентрирована «над» и «под» плоскостью сигма связи (*боковое перекрывание*)

Признаки сравнения	Сигма-связь	Пи-связь
<i>Образование связи</i>		
<b>Вид перекрывания эл.облаков</b>	<b>Осевое</b> ( <i>связи находятся на прямой, соединяющей центры атомов</i> )	<b>Боковое</b> ( <i>связи вне плоскости сигма-связи, взаимно перпендикулярны</i> )
<b>Степень перекрывания</b>	<b>значительная</b>	<b>небольшая</b>
<b>Участвуют</b>	<b>Гибридные эл. облака</b>	<b>Негибридные эл.облака</b>
<b>Положение связи</b>	<b>В плоскости молекулы</b>	<b>Перпендикуляр на плоскости сигма- связи</b>

<b>Признаки сравнения</b>	<b>Сигма-связь</b>	<b>Пи-связь</b>
<i>Особенности связи</i>		
<b>Прочность связи</b>	<b>Высокая 350 кДж/моль</b>	<b>Небольшая 270 кДж/моль</b>
<b>Поляризация связи</b>	<b>Слабо поляризуется</b>	<b>Легко поляризуется</b>
<b>Способность вращения атомов вокруг связи</b>	<b>Свободное вращение</b>	<b>Отсутствует свободное вращение</b>
<b>Способность к хим.реакциям</b>	<b>Низкая</b>	<b>высокая</b>

# Третье валентное состояние атома углерода (на примере молекулы ацетилена)



Атомы углерода в молекуле ацетилена образуют тройную связь, находятся в состоянии **SP** гибридизации

1.




2.



Признаки сравнения	Этан	Этилен	Ацетилен
Структурная формула	$\text{CH}_3\text{—CH}_3$	$\text{CH}_2=\text{CH}_2$	$\text{CH}\equiv\text{CH}$
Вид гибридизации	$sp^3$	$sp^2$	$sp$
Виды связи (C – C)	Сигма - связь	Сигма-, пи - связь	Сигма -, две пи-связи
Длина связи	0,154 нм	0,134 нм	0,120 нм
Прочность связи	350 кДж/моль	620 кДж/моль	810 кДж/моль
Строение	тетраэдрическое	плоское	линейное




# Электронно-графическое строение атома углерода (возбужденное состояние)



Такой атом имеет четыре неспаренных электрона и может принимать участие в образовании четырех ковалентных связей, т. е. имеет валентность четыре.



**Химические связи, образующиеся в результате перекрывания электронных орбиталей вдоль линии связи, называются СИГМА-СВЯЗЯМИ**



**Химические связи, образующиеся в результате «бокового» перекрывания электронных орбиталей вне линии связи, т.е. в двух областях, называются**

**ПИ-СВЯЗЯМИ**

