

Функции распределения случайной величины плотность распределения.

Акишева Ю.Ю.
Еркебаева З.С.
Нуралиева Ж.Н.

Функция распределения случайной величины

Функция распределения вероятностей случайной величины X называется числовая функция $F(x)$, определяющая вероятность того, что случайная величина X примет значение, меньше x :

$$F(x) = P(X < x)$$

где любое x - любое действительное число.

Иногда функцию распределения $F(x)$ называют интегральной функцией распределения.

Свойства функции распределения

Значения функции распределения $F(x)$ принадлежат отрезку $[0;1]$:

$$0 \leq F(x) \leq 1$$

Функции распределения $F(x)$ есть неубывающая функция, т.е.

$$F(x_2) \geq F(x_1), \text{ если } x_2 > x_1$$

Вероятность того, что случайная величина X примет значение, заключенное в интервале (a,b) , равна приращению интегральной функции на этом интервале: $P(a < X < b) = F(b) - F(a)$

Если все возможные значения случайной величины X принадлежат интервалу (a,b) , то $F(x) = 0$ при $x \leq a$; $F(x) = 1$ при $x \geq b$

Для функции распределения справедливы следующие предельные соотношения:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$$

Функция распределения существует как для непрерывных, так и для дискретных случайных величин. Она полностью характеризует случайную величину и является одной из форм закона распределения.


Для дискретной случайной величины функция распределения имеет вид:

$$F(x) = \sum_{x_i < x} P(X = x_i)$$

Знак неравенства под знаком суммы показывает, что суммирование распространяется на те возможные значения случайной величины, которые меньше аргумента x .

Функция распределения дискретной случайной величины X разрывна и возрастает скачками при переходе через каждое значение x_i .

Пример:



Плотность распределения:

Функция распределения полностью характеризует случайную величину, однако, имеет один недостаток. По функции распределения трудно судить о характере распределения случайной величины в небольшой окрестности той или иной точки числовой оси

Определение. *Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины X называется функция $f(x)$ – первая производная от функции распределения $F(x)$.*

Плотность $f(x) = F'(x)$ называют дифференциальной функцией. Для описания дискретной случайной величины плотность распределения неприемлема.

Смысл плотности распределения состоит в том, что она показывает как часто появляется случайная величина X в некоторой окрестности точки x при повторении опытов.

После введения функций распределения и плотности распределения можно дать следующее определение непрерывной случайной величины.

Определение. **Случайная величина X** называется непрерывной, если ее функция распределения $F(x)$ непрерывна на всей оси OX , а плотность распределения $f(x)$ существует везде, за исключением (может быть, конечного числа точек).

Зная плотность распределения, можно вычислить вероятность того, что некоторая случайная величина X примет значение, принадлежащее заданному интервалу.

Теорема. Вероятность того, что непрерывная случайная величина X примет значение, принадлежащее интервалу (a, b) , равна определенному интегралу от плотности распределения, взятому в пределах от a до b .

Геометрически это означает $P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$ — то, что непрерывная случайная величина примет значение, принадлежащее интервалу (a, b) , равна площади криволинейной трапеции, ограниченной осью OX , кривой распределения $f(x)$ и прямыми $x=a$ и $x=b$.

Функция распределения может быть легко найдена, если известна плотность распределения, по формуле:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx$$

Свойства плотности распределения:

Плотность распределения – неотрицательная функция.

$$f(x) \geq 0$$

Несобственный интеграл от плотности распределения в пределах от $-\infty$ до ∞ равен единице


$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1.$$

Пример. Случайная величина подчинена закону распределения с плотностью:

$$f(x) = \begin{cases} a \sin x, & \text{при } 0 \leq x \leq \pi \\ 0, & \text{при } x < 0 \text{ или } x > \pi \end{cases}$$

Требуется найти коэффициент a , построить график функции плотности распределения, определить вероятность того, что случайная величина попадет в интервал от 0 до $\frac{\pi}{4}$

Построим график плотности распределения:



Для нахождения коэффициента a воспользуемся свойством $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^0 0dx + \int_0^{\pi} a \sin x dx + \int_{\pi}^{\infty} 0dx = a \int_0^{\pi} \sin x dx = -a \cos x \Big|_0^{\pi} = 2a = 1;$$

$$a = \frac{1}{2}.$$