Возрастание и убывание функции.

Рано или поздно всякая правильная математическая идея находит применение в том или ином деле.

А.Н. Крылов

Числовые промежутки

- [α;b] – отрезок
- (α;b) – интервал
- (α;b] – полуинтервал
- [α;b) - полуинтервал

Функция f(x) называется ***возрастающей*** на некотором промежутке, если большему значению аргумента соответствует большее значение функции.

$$x_1 > x_2 \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Функция f(x) называется ***убывающей*** на некотором промежутке, если большему значению аргумента соответствует меньшее значение функции.

$$x_1 > x_2 \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Теорема Лагранжа

Пусть функция f(x) непрерывна на отрезке [α;b] и дифференцируема на интервале (α;b). Тогда существует точка c € (α;b), такая, что

$$f(b) - f(\alpha) = f'(c)\,(b - \alpha)$$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



A(α;f(α))
B(b;f(b))

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

угловой коэффициент секущей

Достаточные условия возрастания и убывания функции

Пусть функция f(x) непрерывна на отрезке [α;b] и дифференцируема на интервале (α;b). Тогда если $f'(x)>0$ для всех $x \in (\alpha;b)$,

то функция f(x) возрастает на отрезке [α;b] ,

а если $f'(x)<0$ для всех $x \in (\alpha;b)$,

то функция f(x) убывает на отрезке [α;b] .

доказательство:

Пусть x_1 и x_2 - произвольные точки отрезка $[\alpha;b]$, такие, что $x_1 < x_2$, т.е. $x_2 - x_1 > 0$

По теореме Лагранжа

$f(x_2) - f(x_1) = f'(x)(x_2 - x_1),\ x \in (\alpha;b)$

При $f'(x)>0$ $f(x_2) - f(x_1) > 0 \Leftrightarrow$ функция возрастает.

При $f'(x)<0$ $f(x_2) - f(x_1) < 0 \Leftrightarrow$ функция убывает.