Проект «Фитофаги Саратовской области»

Насекомые вредители зерновых культур

МОУ «СОШ с.Берёзовка» Калачева Евгения Пряхина Виктория

> Руководитель: учитель биологии Чингузова Т.Ф



Вредители

поля

Жук-кузька






Саранча



Вредная черепашка

Трипсы



Взрослые трипсы появляются в начале колошения озимых, обычно в мае-июне. По мере развития злаков сначала заселяют озимую рожь, затем озимую пшеницу. Наиболее интенсивный лёт совпадает с началом колошения яровой пшеницы.

Массовому размножению пшеничного трипса благоприятствует теплая сухая погода.



• Взрослые трипсы длиной 1,5-2 мм, окраска от темнобурой до черной; тело удлиненное, узкое, гибкое; крылья очень узкие с длинной бахромой волосков. Личинки красные.

Вредная черепашка (Eurygaster integriceps)

Отряд
Полужесткокрылых,
семейство
щитниковчерепашек. Широко
распространена в
степной зоне.



Вредитель сельского хозяйства

- Вред: питаются всходами зерновых культур и дикими злаками, повреждают все зерновые культуры (сильнее всего пшеницу), вызывают недоразвитие зерна.
- *Борьба*: обработка зерновых культур по краям поля (применение пестицидов).





Гибель всему растущему

Саранча - уникальное существо с двумя альтернативными генетическими программами развития. Для самой саранчи ее запасная программа - защита от перенаселения, для всех прочих живых существ - причина внезапных бедствий



Саранча

Отряд прямокрылые



Борьба: уничтожение химпрепаратами (но это не эффективно, т.к. особи умирают через несколько дней после отравления, успевая повредить растительность).



Поймать саранчу очень трудно!





Кузька страшный враг хлебов нашей местности

• Жук хлебный, или кузька посевной, широко распространенный степной зоне. Он зеленовато-черный, снизу в светло-серых волосках, надкрылья рыжие с четырехугольным пятном возле щитка, длина 12—15 мм.



Жук летает в июне — июле в жаркую, солнечную погоду





Жук – кузька Вредитель злаковых

Вред: повреждают корневую систему, выедают пыльники, завязь и зерна.

Борьба: механическая обработка поля во время окукливания вредителя (вторая половина мая – начало июня).





Практическое применение работы.

• Все вредители хлебных злаков, о которых мы вам рассказали, были найдены на полях близ села Берёзовка Энгельсского района. О них мы сообщили руководителю к/ф хозяйства Андрею Николаевичу Тимралиеву и предложили недорогие способы борьбы с ними.