Урок 6

Трехгранный угол

Основное свойство трехгранного угла.

<u>Теорема</u>.

В трехгранном угле сумма плоских углов меньше 360° и сумма любых двух из них больше третьего.

<u>Дано</u>: Oabc – трехгранный угол;

$\angle(b; c) = \alpha$; $\angle(a; c) = \beta$; $\angle(a; b) = \gamma$.

<u>Доказать</u>:

1) **$\alpha + \beta + \gamma < 360°$;**
2) **2) $\alpha + \beta > \gamma$; $\alpha + \gamma > \beta$; $\beta + \gamma > \alpha$.**

<u>Дано</u>: Oabc – трехгранный угол;
$\angle(b; c) = \alpha$; $\angle(a; c) = \beta$; $\angle(a; b) = \gamma$.
<u>Доказать</u>:
2) $\alpha + \beta > \gamma$; $\alpha + \gamma > \beta$; $\beta + \gamma > \alpha$.



<u>Доказательство</u>
I. Пусть $\alpha < 90°$; $\beta < 90°$; $(ABC) \perp c$.
Тогда $\angle OBC = 90° - \alpha < \angle OBA$
(следствие из формулы трех косинусов).
Аналогично, $\angle OAC = 90° - \beta < \angle OAB$.
Следовательно,
$\gamma = 180° - (\angle OAB + \angle OBA) < 180° - ((90° - \alpha) + (90° - \beta)) = \alpha + \beta$
Если $\gamma < 90°$, то остальные два неравенства пункта 2) доказываются аналогично,
а если $\gamma \geq 90°$, то они – очевидны.

Формула трех косинусов

Следствия. 1) ***Для вычисления угла между прямой и плоскостью применима формула:***

$$\cos\alpha = \frac{\cos\varphi}{\cos\beta}$$

2) ***Угол между прямой и плоскостью – наименьший из углов, которая эта прямая, образует с прямыми этой плоскости.***

<u>Дано</u>: Oabc – трехгранный угол;
$\angle(b; c) = \alpha$; $\angle(a; c) = \beta$; $\angle(a; b) = \gamma$.
<u>Доказать</u>:

1) **$\alpha + \beta + \gamma < 360°$;**
2) **$\alpha + \beta > \gamma$; $\alpha + \gamma > \beta$; $\beta + \gamma > \alpha$.**



II. На ребрах данного угла отложим точки A’, B’ и C’ так, что |OA’| = |OB’| = |OC’|
Тогда треугольники A’OB’, B’OC’ и C’OA’ – равнобедренные, а их углы при основаниях 1 – 6 – острые.

Для трехгранных углов с вершинами A’, B’ и C’ применим неравенства, доказанные в пункте I:
$\angle C'A'B' < \angle 1 + \angle 6$; $\angle A'B'C' < \angle 2 + \angle 3$; $\angle B'C'A' < \angle 4 + \angle 5$.
Сложим эти неравенства почленно,
тогда $180° < (\angle 1 + \angle 2) + (\angle 3 + \angle 4) + (\angle 5 + \angle 6) =$
$= (180° – \gamma) + (180° – \alpha) + (180° – \beta) \Rightarrow \alpha + \beta + \gamma < 360°$.

<u>Дано</u>: Oabc – трехгранный угол;
$\angle(b; c) = \alpha$; $\angle(a; c) = \beta$; $\angle(a; b) = \gamma$.
<u>Доказать</u>:

1) **$\alpha + \beta + \gamma < 360°$;**
2) **$\alpha + \beta > \gamma$; $\alpha + \gamma > \beta$; $\beta + \gamma > \alpha$.**



III. Рассмотрим луч c' – дополнительный лучу c и для трехгранного угла Oabc' используем неравенство, доказанное в пункте II для произвольного трехгранного угла:
$(180° – \alpha) + (180° – \beta) + \gamma < 360° \Leftrightarrow \alpha + \beta > \gamma$.
Аналогично доказываются и два остальных неравенства

Следствие.

В правильной треугольной пирамиде плоский угол при вершине меньше 120°.

Определение.

Трехгранные углы называются равными если равны все их соответствующие плоские и двугранные углы.

Признаки равенства трехгранных углов.

Трехгранные углы равны, если у них соответственно равны:

1) ***два плоских угла и двугранный угол между ними;***
2) ***два двугранных угла и плоский угол между ними;***
3) ***три плоских угла;***
4) ***три двугранных угла.***

. Аналог теоремы косинусов

Дан трехгранный угол Oabc.

I. Пусть α < 90°; β < 90°; тогда рассмотрим (ABC) ⊥ c

По теореме косинусов из ΔCAB:

$|AB|^2 = |AC|^2 + |BC|^2 - 2|AC| \cdot |BC| \cdot \cos\hat{c}$

Аналогично, из ΔOAB:

$|AB|^2 = |AO|^2 + |BO|^2 - 2|AO| \cdot |BO| \cdot \cos\gamma.$

Вычтем из второго равенства первое и учтем, что

$|AO|^2 - |AC|^2 = |CO|^2 = |BO|^2 - |BC|^2$:

$2|CO|^2 - 2|AO| \cdot |BO| \cdot \cos\gamma + 2|AC| \cdot |BC| \cdot \cos\hat{c} = 0 \Leftrightarrow$

$$\cos\gamma = \frac{|CO|^2}{|AO| \cdot |BO|} + \frac{|AC| \cdot |BC|}{|AO| \cdot |BO|} \cos\hat{c}$$

Заменим: $\frac{|CO|}{|BO|} = \cos\alpha$ $\frac{|BC|}{|BO|} = \sin\alpha$ $\frac{|AC|}{|AO|} = \sin\beta$ $\frac{|CO|}{|AO|} = \cos\beta$



тогда ***cosγ = cosα · cosβ + sinα · sinβ · cos***

II. Пусть $\alpha > 90°$; $\beta > 90°$,
тогда рассмотрим луч c’, дополнительный к c,
и соответствующий трехгранный угол Oabc’,
в котором плоские углы $\pi - \alpha$ и $\pi - \beta$ – острые,
а плоский угол γ и двугранный угол $\hat{c}$ – те же самые.

По **I.:** $\cos\gamma = \cos(\pi - \alpha) \cdot \cos(\pi - \beta) + \sin(\pi - \alpha) \cdot \sin(\pi - \beta) \cdot \cos\hat{c}$

$$\Leftrightarrow \boldsymbol{\cos\gamma = \cos\alpha \cdot \cos\beta + \sin\alpha \cdot \sin\beta \cdot \cos\hat{c}}$$



III. Пусть $\alpha < 90°$; $\beta > 90°$,
тогда рассмотрим луч a’,
дополнительный к a,
и соответствующий трехгранный угол Oa’bc, в котором
плоские углы α и $\pi - \beta$ – острые,
третий плоский угол – $(\pi - \gamma)$,
а противолежащий ему двугранный угол – $(\pi - \hat{c})$

По **I.:** $\cos(\pi - \gamma) = \cos\alpha \cdot \cos(\pi - \beta) + \sin\alpha \cdot \sin(\pi - \beta) \cdot \cos(\pi - \hat{c})$

$\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{\cos\gamma = \cos\alpha \cdot \cos\beta + \sin\alpha \cdot \sin\beta \cdot \cos\hat{c}}$



IV. Пусть $\alpha = 90°$; $\beta = 90°$, тогда $\gamma = \hat{C}$

и равенство, очевидно, выполняется.
Если же только один из этих углов,
например, $\beta = 90°$,
то доказанная формула имеет вид:



$$\cos\gamma = \sin\alpha \cdot \cos\hat{C} \Leftrightarrow \cos\gamma = \cos(90° - \alpha) \cdot \cos\hat{C}$$

<u>Следствие</u>. ***Если*** $\hat{C}$ ***= 90°, то*** $\cos\gamma = \cos\alpha \cdot \cos\beta$ **–**

аналог теоремы Пифагора*!*