


# Ядовитые растения





**ланды**

**ш**

Многолетнее травянистое растение. Красивые цветы ещё с древнейших времен привлекали к себе внимание своими ценными лекарственными свойствами. В сентябре на стрелке вместо цветов появляются красно-оранжевые, как горошины, ягоды. В это время ягоды ландыша в большом количестве поедаются некоторыми хищниками для изгнания кишечных паразитов.

**Все растение ландыша и**

# Дурман обыкновенн ый



Это - высокие травы с цельными листьями, несущими по краям крупные зубцы. Цветы большие, ворончатый складчатый венчик белый. Коробочка усажена шипами. Растёт преимущественно на сырых местах. **Всё растение сильно ядовито, особенно семена.**



# белладонна



Белладонна относится к многолетним паслёновым растениям. Вырастает в высоту до двух метров. Отравляющие вещества в белладонне содержатся не только в чёрных или жёлтых ягодах, но и в её стебле, листьях и цветах. Опасной белладонну делает и то, что растёт она на протяжении всего лета и до поздней осени. Ягоды белладонны имеют достаточно сладкий вкус, что привлекает детей. А фиолетовые цветы напоминают колокольчики. **При отравлении белладонной появляется ощущение сухости во рту, из-за чего сложно говорить и**



# белена чёрная

**Все части растения ядовиты.**

**В народной медицине белену применяют в качестве болеутоляющего средства при воспалениях, при вывихах, болях в суставах и т. д. Мазь из семян используют наружно при туберкулезе костей. Настой белены применяют при фурункулах в начале их появления, а мазью натираются при простуде, кашле,**

# Наперстянка а пурпурная



**Считается одним из самых ядовитых растений. Ядовиты все части растения. Оно вызывает воспалительные процессы слизистых оболочек, подкожной клетчатки, а также вредно действует на сосудистую систему.**



# бузин

У бузины ядовиты листья, цветки, незрелые плоды.

Основные симптомы отравления - головокружение, головная боль, слабость, першение в горле, боли в животе, тошнота, рвота.

Препараты из цветков бузины чёрной обладают потогонным, мочегонным, противовоспалительным, дезинфицирующим действием. Их применяют в виде настоев, напаров, отваров; при простуде, гриппе, заболеваниях верхних дыхательных путей, почек и мочевого пузыря, для полоскания полости рта.



**в**  
**е**

**х**

**Все части веха при растирании между пальцами выделяют специфический неприятный запах. Растение ядовитое в любом виде.**

**Особо ядовит сладкий стебель и сладковатое, с приятным запахом (напоминающим запах сушеных яблок) корневище. Корневище веха ошибочно принимают за репу. Если его съесть, то через 15-20 минут появляется недомогание, слюнотечение, рвота, боль в животе, понос, а затем судорожные припадки, на фоне которых возможна остановка дыхания и сердца.**

**Растёт вех на сырых, болотистых местах. Внешнее сходство с морковью и выраженный морковный запах подземной части приводили к трагическим отравлениям детей.**

# бирючин



**После употребления ягод бирючины  
через 1-2 часа возникают диарея, колики,  
слабость, потеря координации,  
конвульсии, в тяжёлых случаях  
возможен летальный исход**

# паслён сладко- горький



**Симптомы отравления паслёном сладко-горьким - боли в животе, тошнота, рвота, угнетение двигательной и психической активности, затруднение дыхания, сердечно-сосудистая недостаточность.**

**Первая помощь – промывание желудка.**



# воронец

**Растение очень ядовито. Сок растения раздражающе действует на кожу человека, вплоть до образования волдырей. И даже небольшое количество мякоти ягоды достаточно чтобы вызвать сильнейшее расстройство желудочно-кишечного тракта. Не обманитесь тем, что ягоды поедаются птицами. Для птиц, в отличие от других теплокровных, воронец не представляет опасности.**



# ворони й глаз

**Ягода и другие части растения ядовиты.  
Растение вызывает раздражение желудочно-кишечного тракта, понос, тошноту, рвоту, резкое падение ритма сердца и остановку сердца.**



# болиголо

## В

Через несколько минут после попадания в организм начинается рвота, длительная и неукротимая. При болиголове - рвота редкая и непродолжительная. слюнотечение, колики в животе. Затем появляется головокружение, шаткая походка, пена изо рта. Зрачки расширены, судороги сменяются параличом и смертью.

Через полчаса - жжение во рту, слюнотечение, покраснение кожи, тошнота, рвота, расширение зрачков и, позже, синюшность кожи. Мышечные спазмы и конвульсии с нарушением дыхания, затем потеря сознания и смерть, часто в течении 1..2 часов после отравления.



# олеандр

р

**Содержит смертельно опасный яд **олеанин**.**  
**Все операции, будь то обрезка, черенкование или пересадка, следует проводить в перчатках очень осторожно - растение очень ядовито, особенно млечный сок и семена. По окончании работы надо обязательно вымыть руки с мылом. **Не подпускайте к растению детей!****



# Чемериц а

**Чемерица - смертельно ядовитое растение!**

**Тошнота, рвота и замедление пульса - первые признаки отравления. В этом случае необходимо как можно ско-рее вывести яд из организма.**

# Морозник кавказский



Ядовитое растение, в нём содержатся сердечные гликозиды, именно они в больших дозах дают токсический эффект.

Но ведь ещё знаменитый Пара-цельс говорил, что «в природе все есть яд, ничто не лишено ядови-тости, а дело лишь в дозах». Даже змеиный яд в микродозах счита-ется лечебным средством, одно-временно с этим, обычная пова-ренная соль в больших

**Не рви в природе**

**неизвест-**

**ные тебе растения!**

**Часто очень красивые**

**расте-**

**ния являются**

**ядовитыми.**



**Но если все же хочешь**

## • **Помощь при отравлении ядовитыми растениями**

- Промыть желудок - дать больному выпить подряд 5-6 стаканов воды или молока. Затем, раздражая пальцем или чайной ложкой корень языка или заднюю стенку глотки, вызвать рвоту, эту процедуру можно повторить 3-5 раз.
- Уложить больного в постель.
- Приложить тёплые грелки к рукам и ногам.
- Непрерывно давать ему тёплое питье, а при резкой слабости -крепкий чай.
- Если нет жидкого стула, только в первые часы после отравления больному можно дать легкое слабительное средство (одна столовая ложка вазелинового или касторового масла).
- Людям, склонным к гипотонии, давать слабительное малыми дозами, чтобы избежать резкого падения артериального давления из-за большой потери организмом жидкости.
- Вызвать врача.



**В природе  
ничего**

**лишнего нет!**  
Относитесь к ней  
бережно!

