Геометрический смысл производной

Учитель : *Потеряйкина О.Н.*
МОУ СОШ №68
г.Хабаровск

Готфрид Вильгельм фон Лейбниц

1646г – 1716г

Геометрическая интерпретация производной, впервые данная в конце *XVII* в. Лейбницем, который основываясь на результатах Ферма и некоторых других выводах, значительно полнее своих предшественников



$$k = \frac{y}{x} = \frac{\textit{противолежащий катет}}{\textit{прилежащий катет}} = tg\ a$$

$$k = tg\ a$$

k – угловой коэффициент прямой

a –угол между прямой и положительным направлением оси абсцисс





$$k(h) = tg < MAC = \frac{MC}{AC} = \frac{f(x+h) - f(x)}{x+h - x}$$



Если h ⟶ 0, тогда M ⟶ A

Прямая MA стремиться занять положение некоторой прямой, которую называют касательной к графику функции y=f(x)

$$\lim_{h \to 0} k(h) \quad \frac{f(x+h) - f(x)}{x+h-x} = f'(x)$$

$$\boxed{k = tg\, a = f'(x)}$$

Значение производной в точке равно угловому коэффициенту касательной к графику функции в этой точке



$k = tga = f'(x) > 0$



$k = tga = f'(x) < 0$



$k = tga = f'(x) = 0$

Если угол наклона прямой, то тангенс не существует, а значит, производная не существует.

Выведем уравнение касательной к графику дифференцированной функции в точке (x_0; $f(x_0)$)



$$y=kx+b \quad (1)$$

$$k = tg\,a = f'(x)$$

$$y=f'(x_0)x+b \quad (2)$$

Т.к. касательная проходит через точку с координатами $(x_0; f(x_0))$, подставим ее координаты в уравнение (2) и найдем b

$$f(x_0)=f'(x_0)x_0+b \quad \Rightarrow \quad b=f(x_0)-f'(x_0)x_0$$

Подставьте в уравнение (2) значение b и сделав соответствующие преобразования получите:

$$y=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$$

Алгоритм нахождения уравнения касательной к графику функции **y=f(x)** в точке с абсциссой x_0

1. $f(x_0)$ – *находим значение функции в данной точке*
2. $f'(x)$ – *находим производную данной функции*
3. $f'(x_0)$ - *находим значение производной функции в данной точке*
4. *Подставляем данные в уравнение касательной к графику функции*

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$