

Государственный медицинский университет г.Семей  
Кафедра: Травматологии и профилактической медицины  
Дисциплина: Введение в клинику-2

*СРС*

# Алгоритм действия медсестры при почечной колике

Выполнила: Буркитова Р.  
215 группа ОМФ  
Проверила: Раисова Г.К.

## Введение

Почечная колика и причины  
ее возникновения.

Симптомы при почечной  
колике

Алгоритм диагностики и лечения  
почечной колики

Список использованной литературы

# **ВВЕДЕНИЕ**

**Почечная колика является синдромом, который, не раскрывая причины заболевания, лишь свидетельствует о вовлечении в патологический процесс почки или мочеточника.**

Для почечной колики характерно внезапное появление интенсивных болей в поясничной области, нередко ночью, во время сна, иногда после физической нагрузки, длительной ходьбы, тряской езды, приема большого количества жидкости или мочегонных препаратов.

# Почечная колика

**это симптомокомплекс,  
возникающий при остром  
нарушении оттока мочи из  
почки**

# Причины

## возникновения

препятствия на пути оттока мочи  
из почечной лоханки

Переполнению, повышению  
внутрилоханочного давления

Венозный стаз


Растяжение  
почечной капсулы

Ишемия почки с отеком  
ее интерстициальной ткани

---

Наиболее часто обструкция верхних мочевых путей обусловлена камнем в мочеточнике. Окклюзия мочеточника может также наступить при стриктурах, перегибах и перекрутах мочеточника, при обтурации его просвета сгустком крови, слизи или гноя, казеозными массами (при туберкулезе почки), отторгнувшимся некротизированным сосочком.

---




Почка

Камень →

← Мочеточник →

Мочевой  
пузырь

Камни



# Приступ почечной колики

начинается внезапно.

Чаще всего он бывает вызван  
физическим

напряжением, но может наступить и  
среди

полного покоя, ночью во время сна,  
часто после обильного питья.

Боль режущая с периодами затишья и  
обострения.

# Симптомы



---

Нередко почечную колику сопровождает тошнота, многократная рвота, задержка стула и газов, вздутие живота, что затрудняет диагноз. При пальпации выявляется резкая болезненность в области почки, резистентность мышц на стороне заболевания. Иногда удается прощупать увеличенную и болезненную почку. Нередко может быть микрогематурия. В ряде случаев наблюдается повышение температуры, озноб, лейкоцитоз при отсутствии других признаков мочевой инфекции.

---

---

**Характерно беспокойное поведение больных, которые стонут, мечутся, принимают невероятные позы и не могут найти положения, в котором бы интенсивность боли уменьшилась. Появляются бледность, холодный пот. Иногда повышается АД.**


**Дизурические явления довольно часто сопутствуют приступу почечной колики.**

**Дизурия проявляется учащенным, болезненным мочеиспусканием: чем ближе к мочевому пузырю локализуется камень, тем резче дизурия.**

---







**Рис. Алгоритм диагностики и лечения почечной колики и мочекаменной болезни**

# Список литературы

- Сестринское дело. Программа для средних специальных учебных заведений. - М., 1990.
- Внутренние болезни: Учебник/ Ф.И. Комаров, В.Г. Кукес, А.С. Сметне; под редакцией Ф.И. Комарова, М.: «Медицина», 1990г.
- Сайты интернета.

---

*Спасибо  
за  
внимание*

---