# Саркоидоз в практике врача поликлиники

#### Саркоидоз

- Саркоидоз системный относительно доброкачественный гранулематоз неизвестной этиологии.
- Характеризуется скоплением Т-лимфоцитов и мононуклеарных фагоцитов, образованием не секретирующих эпителиоидно-клеточных неказеинфицированных гранулем.
- При саркоидозе преобладают внутригрудные проявления, однако описаны поражения всех органов и систем, кроме надпочечника.
- В настоящее время значительное число пациентов находится под наблюдением не у фтизиаторов, как это было раньше, а у врачей поликлиники.

# Формы болезни

Раздел МКБ 10	Нозологическая форма
D 86	Саркоидоз
D 86,0	Саркоидоз легких
D 86,1	Саркоидоз лимфатических узлов
D 86,2	Саркоидоз легких и лимфатических узлов
D 86,3	Саркоидоз кожи
D 86,8	Саркоидоз других уточненных локализаций

#### Формы саркоидоза

- В обычной повседневной практике выделяют
  - Саркоидоз органов дыхания
  - Саркоидоз других органов
  - Генерализованный саркоидоз

- В реальной практике саркоидоз обнаруживается как правило случайно при выполнении рентгенологического обследования.
- Рентгенологически выделяют 4 стадии болезни

# Стадия I. Внутригрудная лимфаденопатия. Паренхима легких не изменена



# Стадия II. Лимфаденопатия корней легких и средостения. Патологические изменения паренхимы легких



# Стадия III. Патология легочной паренхимы без лимфаденопатии



#### Стадия IV. Необратимый фиброз легких



# Эпидемиология саркоидоза

- Заболеваемость 3 случая на 100000 населения
- В ряде регионов значительно выше: Татарстан – 15 случаев на 100000 населения.

#### Этиология и патогенез

- Единого этиологического фактора нет. Предполагают участие
  - Инфекционного агента (Chlamidia pneumoniae, Propionibacterium acnes, вирус простого герпеса).
  - Экологические факторы (металлическая пыль), связь с курением отсутствует.
  - Найдена связь с экспрессией генов, отвечающих за выработку АПФ, ФНО рецепторов к витамину D.
  - Эти причины запускают процесс системного хронического воспаления, так как гранулематозное воспаление – вариант системного воспаления.

# Клиника саркоидоза

- Усталость. Повышенная утомляемость или их аналоги (синонимы) в зависимости от интеллекта больного.
- Особенности утомляемость и усталость возникают остро, прогрессируют, заставляют пациента сократить объем нагрузок вплоть до пассивного образа жизни.
- Выделяют:
  - Утренняя усталость невозможность подняться с постели.
  - Интермиттирующая усталость отмечается в течение дня, требует дневного сна или его аналогов.
  - Вечерняя усталость чувствует себя выжатым к началу второй половины дня.
  - Системный (постсаркоидозный) синдром усталости усталость весь день+миалгии+депрессия

# Клиника саркоидоза

- Боли в грудной клетке. Характерны длительные, по характеру ближе к чувству дискомфорта, не связанные с актом дыхания.
- Одышка. Появляется через некоторое время.
   Обусловлена включением в процесс легочной ткани.
- Лихорадка. В большинстве случаев совпадает с дебютом болезни. Характерен субфибрилитет
- Менее частые жалобы артралгия.

# Особенности сбора анамнеза.

- Обязательные уточнения:
  - О перенесенных ранее артритах (симметричных)
  - О перенесенных ранее двусторонних прикорневых пневмониях
  - О имеющей место лимфоаденопатии
- По карте анализируются все случаи дообследования после флюорографии. Это актуально для РФ, так как профосмотры включают в себя флюорографию как обязательный элемент.
- Положительный ответ на поставленные вопросы повышает вероятность саркоидоза как диагноза. Особое значение придается быстрой динамике двусторонних прикорневых образований.

#### Физикальный осмотр

- Осмотр кожи. Поиск узловой эритемы красных плотных индуративных образований, локализующихся чаще на коже голеней.
- При надавливании эритема болезненна. При угасании процесса остается слабофиолетовый след.



#### Физикальный осмотр

- Суставы. Деформация не характерна, хотя пациенты часто описывают артралгию суставов кистей.
- Лимфатические узлы. Осматриваются и пальпируются все группы. Любой увеличенный узел рассматривается как объект биопсии.
- Неврологический статус. Поиск параличей. Характерен паралич Bell – паралич лицевого нерва.
- Аускультация сердца, легких. Информативна на поздних стадиях.

# Клиническая картина

- Ведущий синдром синдром Лефгрена:
  - Лихорадка + двусторонняя лимфоаденопатия корней легких + полиартралгия + узловая эритема.
- В клинической картине возможны различные комбинации, однако лимфоаденопатия обязательна, причем ее динамика достаточно быстрая.
- Редкий клинический вариант синдром Хеерфорта-Вальденстрема:
  - Лихорадка + увеличенные околоушные узлы + передний увеит + паралич Bell.

# Клиническая картина

- Для течения болезни характерны:
  - Обилие жалоб при скудных результатах физикального обследования
  - Спонтанность разрешения и цикличность течения
  - Отсутствие тяжелой интоксикации

#### Постановка диагноза

- Диагноз ставится методом исключения.
- При обнаружении на рентгенограмме инфильтрации и лимфоаденопатии исключают:
  - Туберкулез
  - Онкологическое поражение
  - Неспецифическое заболевание
- Выполнение простой рентгенограммы скрининговый метод
- Современный подход компьютерная томогорафия высокого разрешения

#### Постановка диагноза

- Характерные рентгенологические синдромы:
  - Синдром «матового стекла» снижение прозрачности легких. В основе – саркоидозный альвеолит.
  - Синдром диссеминации. Мелкоочаговые тени диаметром от 0,1 до 0,7 см. Это слияния эпителиоидных гранулем. Гранулемы располагаются перилимфатически. Это – отличие от туберкулеза.
  - Синдром фиброза. Это исход позднего процесса.

#### Методы окончательной диагностики

- Рентгенологические находки являются основанием для проведения следующих исследований:
  - Трансбронхиальная биопсия. Обнаружение в биоптате низкодифференцированной эпителиоидно-клеточной гранулемы делает диагноз окончательным.
  - При невозможности биоптатного исследования делают видеоторакоскопическю биопсию.
  - При невозможности выполнения биопсий проводят пробу Квейма-Зильтцбаха. Подкожно вводится пастеризованная суспензия селезенки, пораженной саркоидозом. Через 3-6 недель в месте введения возникает папула (до 8 см). Проводится биопсия папулы и оценка по критериям оценки биоптата на саркоидоз.

#### Методы лабораторного контроля

Метод	Характерно
Общий анализ крови	Повышение СОЭ, возможен лейкоцитоз
Проба Манту	Чаще отрицательная, хотя возможны ложные реакции
Оценка уровня кальция в крови и моче	Гиперкальциемия

• Стандартов нет, так как 70% случаев дают спонтанную ремиссию. Проведенная гормональная терапия снижает в последующем вероятность спонтанной ремиссии. В случае отсуствия реальной угрозы жизни и в период активной диагностики предпочтительна выжидательная тактика.

- В выжидательном периоде:
  - Пентоксифиллин до 1200 мг/сутки. Снижает выработку ФНО-α, оказывая системный противовоспалительный эффект.
  - НПВС. Только при картине артрита. Не влияют на легочные проявления болезни.
- Переход к гормональной терапии требует специального решения.
  - Критерии перехода
    - Быстрое прогрессирования симптомов
    - Увеличение теней в легких
    - Быстрое снижение ЖЕЛ
    - Появление нарушений проводимости
    - Появление паралличей (кроме Bell)
    - Передний увеит с угрозой слепоты.
  - Данным критериям соответствуют менее 10% больных

- Глюкокортикоидная терапия
  - Начальная доза 0,5 мг/кг/сутки в течение 2-3 месяцев
  - Либо 10 мг 1 раз в сутки 2-3 месяца
  - Снижение дозы по 5 мг/сутки в течение 6 месяцев
  - Отмена препарата.
- Рецидив болезни возможен через 3-4 месяца.
   Лечение рецидива только в условиях стационара пульс-терапией по 3 г/сутки в течение 3 дней.
- При снижении дозы глюкокортикоидов назначить делагил 0,25 мг 3 раза в сутки в течение 6 месяцев

- Применение делагила
  - Делагил является основой для лечения саркоидоза с поражением кожи и костей, а также при гиперкальциемии. Доза препарата 0,25 мг/3 раза в сутки
- При состояниях, рефрактерных к терапии глюкокортикостероидами, назначают метотрексат. в/м 7,5-20 мг 1 раз в неделю в течение 1-6 месяцев.

- Другие методы лечения
  - Разгрузочная терапия. Снижение жировой массы улучшает течение болезни.
  - Плазмаферез. Обсуждается при неэффективности лечения гормонами или как дополнительный метод при рецидивах
  - Трансплантация легких. Известны единичные случаи при фиброзе легких.

### Клинический пример

- Пациент С. находится на пожизненном наблюдении. При визитах оценивается состояние:
  - Лимфатические узлы все группы. Пальпаторно + 1 рентгенограмма.
  - Сердце. ЭКГ на наличие АВ-блокад
  - Печень УЗИ с целью выявления признаков холестаза или появления гранулем. Уровень ЩФ.
  - Кожа. Осмотр с целью выявления узловой эритемы.
  - Нервная системы. Параличи
  - Суставы осмотр, расспрос, поиск артралгий.

# Клинический пример

- Уровень гемоглобина возможность гемолитической анемии
- Уровень СОЭ
- Уровень кальция
- Почки. УЗИ для исключения нефрокальциноза.
- Яички. УЗИ для исключения гранулематозного поражения, увеличение.
- Предстательная железа. УЗИ для исключения гранулематозного поражения
- Молочная железа. Маммография для исключения гранулематозного поражения.