

ЛЕКЦИЯ №2

Классификация ядов. Общая характеристика токсического действия. Формирование токсического эффекта. Физико-химические характеристики токсических веществ. Применение при решении вопросов биохимической и аналитической токсикологии.

Яд – вещество, вызывающее отравление или смерть при попадании в организм.

Абсолютных ядов в природе не существует, то есть нет таких химических веществ, которые способны приводить к отравлению при любых условиях.

Интоксикация (отравление) (intoxicatio; ин- + греч. toxikon яд) - патологическое состояние, вызванное общим действием на организм токсических веществ эндогенного или экзогенного происхождения.

Отравление – это «химическая травма»



Токсическое действие химического вещества зависит от:

- его дозы (токсической);
- физических и химических свойств;
- условий применения (путь введения, наличие и качество пищи в желудке);
- состояние организма человека (пол, возраст, болезнь, вес, генетические факторы и др.)
- присутствия других веществ, вместе с которыми вводится яд в организм. При этом действие ядов может усилиться – проявляется синергизм (например, барбитураты или алкалоиды с алкоголем), или ослабляться.

Классификация веществ, вызывающих отравление.

1. Химическая классификация:

- Органические
- Неорганические
- Элементарорганические.

3. Гигиеническая классификация:

- Чрезвычайно токсичные

(DL₅₀ при введении в желудок < 15 мг/кг)

- Высокотоксичные (DL₅₀ 15 -150 мг/кг)
- Умереннотоксичные (DL₅₀ 151 -5000 мг/кг)
- Малотоксичные (DL₅₀ > 5000 мг/кг)

2. Практическая классификация:

- Промышленные яды: органические растворители (дихлорэтан, четыреххлористый углерод), топливо (пропан, бутан), красители (анилин, индофеноловые соединения), хладоагенты (фреоны), химические реагенты (метанол, уксусный ангидрид), пластификаторы (диметилфталат).
- Пестициды –инсектициды, зооциды, фунгициды, бактерициды и т.д.
- Лекарственные средства
- Бытовые токсиканты – пищевые добавки, средства санитарии, личной гигиены, средства ухода за одеждой, мебелью, автомобилями и др.
- Биологические растительные и животные яды
- Боевые отравляющие вещества (зарин, иприт, фосген и др.)

4. Токсикологическая классификация:

| Токсичные вещества | Особенности действия |
|--|---|
| Цианиды и синильная кислота, угарный газ, этанол, этиленгликоль | Общетоксическое действие (гипоксические судороги, отек мозга, параличи) |
| Летучие яды (хлорпроизводные углеводородов, уксусная кислота, арсин, пары металлической ртути) | Кожно-резорбтивное действие с общетоксическими явлениями |
| Фосфорорганические инсектициды (карбофос), алкалоиды (никотин) | Нервно-паралитическое действие (бронхоспазм, удушье, судороги и параличи) |
| Наркотические и психотропные вещества | Психотропное действие (нарушение психической активности) |
| Оксиды азота, фосген | Удушающее действие (токсический отек легких) |
| Хлорпикрин (трихлорнитрометан), пары кислот и щелочей | Слезоточивое и раздражающее действие (раздражение слизистых оболочек) |

5. Классификация по «избирательной токсичности»:

| Характер «избирательной токсичности» | Токсичные вещества |
|--|--|
| «Сердечные яды» - Кардиотоксическое действие (нарушение ритма и проводимости сердца, токсическая дистрофия миокарда) | Сердечные гликозиды, трициклические антидепрессанты, растительные яды, животные яды, соли бария и калия |
| «Нервные яды» - Нейротоксическое действие (нарушение психической активности, токсическая кома, параличи) | Психофармакологические средства (наркотики, транквилизаторы, снотворные), фосфорорганические соединения, угарный газ, алкоголь и его суррогаты |
| «Печеночные яды» - Гепатотоксическое действие (токсическая гепатопатия) | Хлорированные углеводороды, ядовитые грибы, фенолы и альдегиды |
| «Почечные яды» - Нефротоксическое действие (токсическая нефропатия) | Соединения тяжелых металлов, этиленгликоль, щавелевая кислота |
| «Кровяные яды» - Гематоксическое действие (гемолиз, метгемоглобинемия) | Анилин и его производные, нитриты, мышьяковистый водород |
| «Желудочно-кишечные яды» - Гастроэнтеротоксическое действие (токсический гастроэнтерит) | Концентрированные кислоты и щелочи, соединения тяжелых металлов и мышьяка. |

6. Классификация веществ, вызывающих отравление при ХТА.

I. Токсические вещества органической природы.

1. **Группа токсикологически важных веществ, изолируемых дистилляцией («летучие яды»):** синильная кислота, спирты, этиленгликоль, алкилгалогениды (хлороформ, хлоралгидрат, четыреххлористый углерод, дихлорэтан), формальдегид, ацетон, фенол, уксусная кислота.

2. **Группа токсикологически важных веществ, изолируемых экстракцией и сорбцией:**

- лекарственные средства (барбитураты, алкалоиды, синтетические лекарственные вещества – 1,4-бензодиазепины, производные фенотиазина, фенилалкиламины);
- наркотические вещества (каннабиноиды, эфедрон);
- пестициды (ФОС, хлорорганические – гептахлор, гексахлорциклогексан, производные карбаминовой кислоты – севин).

II. Токсикологические вещества неорганической природы.

1. **Группа токсикологически важных веществ, изолируемых минерализацией:** «металлические яды» - соединения Ba, Pb, Mn, As, Cu, Sb, Bi, Hg и др.
2. **Группа токсикологически важных веществ, изолируемых экстракцией водой:** кислоты (серная, азотная, соляная), щелочи (гидроксиды натрия, калия, аммония), нитраты и нитриты.
3. **Группа токсикологически важных веществ, требующих особых методов изолирования:** соединения фтора.
4. **Группа веществ, не требующих особых методов изолирования:** вредные пары и газы, оксид углерода.

Доза – количество вещества, введенное или попавшее в организм (отнесенное как правило, единице массы тела человека или животного) и дающее определенный токсический эффект.

Доза токсическая - доза, вызывающая в организме патологические изменения, не приводящие к смертельному исходу. Токсические дозы занимают диапазон доз от минимальной токсической до минимальной смертельной.

Доза токсическая минимальная (MTD) - это пороговая доза в отношении эффекта, выходящего за пределы нормальных физиологических реакций.

Доза смертельная минимальная (MLD) - доза, вызывающая за фиксированный период времени гибель единичных, наиболее чувствительных подопытных животных; принимается за нижний предел дозы смертельной.

Доза смертельная средняя (DL₅₀) - доза, вызывающая за фиксированный период времени гибель 50% подопытных животных.

Доза смертельная абсолютная (DL₁₀₀) - доза, вызывающая за фиксированный период времени гибель не менее, чем 99% подопытных животных.

размерность мг/кг, мкг/кг, моль/кг (СИ).

Полный (общий, ненаправленный) судебно-химический анализ проводится обязательно на вещества 1,2 групп из веществ органической природы и 1 группу из веществ неорганической природы, т.е. на группы «летучих», «лекарственных» и «металлических» ядов и пестициды.

Формирование токсического эффекта включает 4 стадии:

- доставка токсиканта к органу- мишени;
- взаимодействие с эндогенными молекулами –мишенями и другими рецепторами токсичности;
- инициирование нарушений в структуре и/или функционировании клеток;
- восстановительные процессы на молекулярном, клеточном и тканевом уровнях.

Биотрансформация ксенобиотика с образованием токсичных продуктов называется **метаболической активностью** или **летальным синтезом**.


Биотрансформация, сопровождающаяся снижением содержания токсиканта в организме, называется **детоксикацией**.

Мишени для токсикантов – практически все эндогенные соединения:

1. Макромолекулы, находящиеся либо на поверхности, либо внутри отдельных типов клеток (чаще всего это внутриклеточные ферменты).
2. Нуклеиновые кислоты (особенно ДНК)
3. Белки
4. Клеточные мембраны
5. Ферменты (мишень в основном для токсического метаболита), т.к. сам фермент ответственен за синтез этого метаболита.

на молекулярном уровне токсичность – это химическое взаимодействие между токсикантом и молекулой-мишенью.

Взаимодействие химических веществ с рецепторами токсичности.




Рецептор токсичности (Пауль Эрлих 1900 г) – это химически активная группировка, в норме участвующая в метаболизме клетки, к которой способна присоединится молекула ксенобиотика.


Механизм - лиганд-рецепторный

«Оккупационная» теория

**максимальный токсический эффект наблюдается при полном
заполнении рецепторов токсикантом**



$$K = \frac{[\text{Tox} - R]}{[\text{Tox}] \cdot [R]}$$



K – константа равновесия;

$[\text{Tox}]$ – равновесная концентрация токсиканта (молекулы, иона, радикала);

$[R]$ – равновесная концентрация рецептора (молекулярного, клеточного);

$[\text{Tox}-R]$ – равновесная концентрация продукта взаимодействия.

Кинетическая теория

максимальный ответ на токсическое воздействие определяется скоростью и механизмом связывания токсиканта с рецептором.

Внутренняя активность токсиканта ($R/N_{\text{зан}}$) - способность давать токсический эффект (ответ организма R) при минимальном заполнении рецепторов ($N_{\text{зан}}$).

Классы токсикантов, взаимодействующих с рецепторами:

- антагонисты (ингибирует действие нативных субстратов (эндогенных соединений), блокируя их связывание с рецепторами),
- агонисты,
- частичные агонисты (активируют рецепторы, взаимодействуя с ними, и дают токсический эффект, равный или превышающий эффект нативного субстрата). - «**токсикомиметики**»

Математическая зависимость между ответом и дозой (концентрацией)


$$R = \frac{R_{\max} \cdot D}{(D + D_{50})}$$

R – ответ при дозе токсиканта D ;

R_{\max} - максимально возможный ответ на воздействие;

D_{50} - доза токсиканта, вызывающая ответ, равный половине максимального.

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_{\max}} + \frac{D_{50}}{R_{\max}} \cdot \frac{1}{D}$$



ТОКСИЧНОСТЬ КСЕНОБИОТИКА

**Физико-химические свойства
ксенобиотика**

**Физико-химические свойства
биологической среды**

**Устойчивость вещества –энергия
Гиббса**

**Проницаемость клеточных
мембран**

Кислотно-основные свойства

**Окислительно-
восстановительный потенциал**

**Способность к электрической
диссоциации (ионизации)**

Растворимость

Липофильность

Диффузионная способность

Поверхностная активность

Адсорбционные свойства

Способность к комплексообразованию

Физико-химические характеристики токсиканта и биологической среды, влияющие на механизмы токсичности.

1. Влияние растворимости ксенобиотика в биологических средах на его токсичность.

а) Межфазные переходы $тв \leftrightarrow ж$, диаграммы рН-растворимость.

б) Межфазные равновесия $ж_1 \leftrightarrow ж_2$, коэффициент распределения.

в) Влияние кислотно-основной природы ксенобиотиков и рН биосред на межфазные равновесия $ж_1 \leftrightarrow ж_2$.

г) Влияние окислительно-восстановительного потенциала E^0 и рН среды на токсичность ксенобиотика. Диаграммы рН-потенциал для биосред и токсикантов.

***2. Корреляция структуры ксенобиотика и его токсичности.
Топологические индексы.***

а) Межфазные переходы тв↔ж, диаграммы рН-растворимость




Рис. 9. Диаграмма рН — растворимость оксида мышьяка (III).

1,2,3 — расчетные и 4 — экспериментальная кривая растворимости;


1', 2' — равновесные прямые кислотно-основной ионизации различных форм As (III).

в) Влияние кислотно-основной природы ксенобиотиков и pH биосред на межфазные равновесия $ж_1 \leftrightarrow ж_2$


для кислот:




$$pH = pK_a + \log \frac{[\text{ионизированная форма}]}{[\text{неионизированная форма}]}$$



для оснований:



$$pH = pK_a + \log \frac{[\text{неионизированная форма}]}{[\text{ионизированная форма}]}$$



$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

$$\frac{[A^-]}{[HA]} = 10^{pH - pK_a}$$

$$pK_a = 14 - pK_b$$

$$pH = pK_a + \log \frac{[B]}{[BH^+]}$$

$$\frac{[B]}{[BH^+]} = 10^{pH - pK_a}$$

при $pH = pK_a$ $[A^-] = [HA]$.

$$\alpha = \frac{1}{10^{pK_a - pH} + 1}$$

при $pH = pK_a$ $[BH^+] = [B]$.

$$\alpha = \frac{1}{10^{pH - pK_a} + 1}$$



моча (pH 4,8-7,4), плазма крови (pH 7,35-7,45) желудочный сок (pH 1,5-1,8).

Фуросемид ($pK_a = 3,9$)

$$\lg \frac{[A^-]}{[HA]} = pH - pK_a$$

Эфедрин ($pK_a = 9,6$)

$$\lg \frac{[BH^+]}{[B]} = pK_a - pH$$



Содержимое
желудка

Плазма
крови

Моча

Рис. Распределение слабой кислоты (фуросемид) и слабого основания (эфедрин) между жидкими средами организма.

г) Влияние окислительно-восстановительного потенциала E^0 и pH среды на токсичность ксенобиотика. Диаграммы pH-потенциал для биосред и токсикантов.

