

# Биоиндикационные исследования районов с разной степенью загрязненности атмосферы

[Prezentacii.com](http://Prezentacii.com)

# Введение



**Цель работы** – изучение возможности использования биоиндикации для определения степени загрязненности атмосферы.

**Актуальность** исследовательской работы обусловлена тем, что проблема загрязненности атмосферы является общемировой. В настоящее время ученые бьют тревогу, призывая нас к сохранению и защите окружающей среды, а так же ко всяческой помощи ей. Но не каждый знает, в чем состоит проблема его края, поэтому, как альтернативный вариант, мы предлагаем биоиндикацию



## Задачи работы:


- определить видовой состав лишайников;
- составить коллекцию лишайников;
- провести качественную оценку загрязнения воздуха с помощью лишайников (лихеноиндикация) и по состоянию хвои сосны;
- выявить районы с высокой степенью загрязненности атмосферы;
- предложить меры по улучшению состояния окружающей среды.



- **Объектом** исследования является лихенофлора и сосна.
- **Предметом** исследования стала биоиндикация с помощью лишайников и хвои сосны зависимости от степени загрязнения атмосферы.
- **В ходе исследования были использованы методы:** наблюдение, эксперимент, количественный и качественный методы анализа, сравнение, обобщение, сопоставление данных и др.

# ОСОБЕННОСТИ ЛИШАЙНИКОВ КАК БИОИНДИКАТОРОВ

- Специфический признак лишайников – симбиотическое сожительство двух разных организмов – гетеротрофного гриба (микобионт) и автотрофной водоросли (фикобионт).
- Тело лишайника, называемое слоевищем, или талломом, на органы не расчленено.









# СОСНА КАК БИОИНДИКАТОР

- Сосна относится к древесным голосеменным вечнозеленым растениям
- Древесина растений заполняет почти всю массу ствола, сердцевина у них развита слабо и кора очень тонкая
- Считается, что для условий лесной полосы России наиболее чувствительны к загрязнению воздуха сосновые леса

- Информативными по техногенному загрязнению являются морфологические и анатомические изменения, а также продолжительность жизни хвои.


# *Проводимые исследования*

## **1. Качественная оценка загрязнения воздуха с помощью лихеноиндикации**

- Цель: **Определить степень  
загрязнения воздуха в различных  
районах:**
  - 1) город Северодвинск
  - 2) сот « Уйма » (6 км удаленности от города Северодвинска)
  - 3) поселок Важский (320 км удаленности от города Северодвинска)


- Вывод: После всех проведенных работ можно с уверенностью сказать, что самое большое загрязнение наблюдается в городе. На участке, рассмотренном в Северодвинске, не было найдено ни одного кустистого лишайника и достаточно малое количество листоватых лишайников.

# Разнообразие лишайников ( Г. Северодвинск)




- Накипные
- Кустистые
- Листоватые

На территории сот «Уймы» наблюдается постепенное увеличение количества листоватых лишайников в зависимости от степени удаленности от города.



# На территории п. Важский присутствуют все виды лишайников в достаточно большом количестве



## 2. Определение видового состава лишайников и составление коллекции

Обилие и покрытие каждым видом лишайника субстрата было определено по бальной шкале Браун – Бланке:

- встречается редко, степень покрытия ничтожна:
- индивидуумов много, степень покрытия мала или особи разрежены, но площадь покрытия большая.
- индивидуумов много, степень проективного покрытия не менее 10%, но не более 25%.
- любое кол-во индивидуумов, степень покрытия 25-50%.
- любое кол-во индивидуумов, степень покрытия 50-75%
- степень покрытия более 75%, число особей любое.




**В ходе исследований были определены следующие виды лишайников:**

*Семейство кладониевые (cladoniaceae)-  
кладония альпийская (cladonia alpestris)*



# Семейство кладониевые - кладония лесная- (*cladonia sylvatica*)




**Семейство кладониевые  
(cladoniaceae) - кладония мягкая  
(cladonia mitis)**



***Семейство пармелиевые  
(Parmeliaceae) - гипогимния вздутая  
(Hypogymnia Physodes)***



# *Семейство уснеевые (Usneaceae) - уснея длиннейшая*



***Семейство пельтигеровые  
(Peltigeraceae) - пельтигера  
пупырчатая***



***Семейство телошистовые  
(Teloschistaceae) - ксантория  
настенная***



### 3. Биоиндикация воздушного загрязнения по состоянию хвои сосны

- Цель: Провести биоиндикацию с помощью хвои сосны в этих же районах. Определить:
- **Степень вытоптанности участка:**
  - 1- вытаптывания нет;
  - 2 - вытоптаны тропы;
  - 3 - ни травы, ни кустарников нет;
  - 4 - осталось немного травы возле деревьев;



- **Классы повреждения хвои:**

- 1 - хвоинки без пятен;
- 2 - хвоинки с небольшим числом мелких пятен;
- 3 - хвоинки с большим числом черных и желтых пятен, некоторые из них крупные – во всю ширину хвоинки.

- **Классы усыхания хвои:**

- 1 - нет сухих участков;
- 2 - усох кончик;
- 3 - усохла треть хвоинки;
- 4 - вся хвоинка жесткая или больше половины ее длины сухая.

- Вывод: Так же, как и в случае с лишеноиндикацией, наблюдается постепенное улучшения состояния хвои сосны, в зависимости от степени удаленности от города и городской черты, транспортных магистралей и т.д.



# ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

В ходе выполнения работы нами был определен видовой состав лишайников:

- для п. Важский: Семейство кладониевые (Cladoniaceae) - кладония альпийская, кладония лесная, кладония мягкая; Семейство пармелиевые (Parmeliaceae)- пармелия воздушная, гипогимния вздутая; Семейство уснеевые (Usneaceae) - уснея длиннейшая, Семейство пельтигеровые (Peltigeraceae) - пельтигера пупырчатая
- для сот «Уйма»: семейство кладониевые (Cladoniaceae) - кладония мягкая; Семейство пармелиевые (Parmeliaceae)- пармелия воздушная, гипогимния вздутая; Семейство пельтигеровые (Peltigeraceae) - пельтигера пупырчатая; Семейство телошистовые (Teloschistaceae)- ксантория настенная
- для г. Северодвинска: Семейство пармелиевые (Parmeliaceae)- пармелия воздушная; Семейство телошистовые (Teloschistaceae)- ксантория настенная.

# Выводы по работе

- Наиболее беден видовой состав в Северодвинске.
- При проведении качественной оценки загрязнения воздуха с помощью лишайников (лихеноиндикация) и по состоянию хвои сосны выявили районы с высокой степенью загрязненности атмосферы – это г. Северодвинск и его окрестности. По мере удаления от промышленного центра состояние атмосферы улучшается, что подтверждено методами биоиндикации.