




Предел последовательности и функции



Цели:

- Сформировать понятие предела последовательности, функции;
- Ввести понятие сходящихся и расходящихся последовательностей, горизонтальной асимптоты;
- Сформировать умения вычисления пределов.



Пояснительная записка

Изучение данного учебного элемента разбито на несколько этапов. После каждого этапа вам необходимо будет выполнить практические задания в своей рабочей тетради.

По окончании изучения элемента вам предстоит выполнить контрольную работу по этой теме также в своей тетради. Рабочую тетрадь по окончании изучения сдать на проверку учителю.

Желааем удачи!

Сопутствующие учебные материалы

- Алгебра и начала анализа. 10 -11 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович. : 2-е – изд. – М.: Мнемозина, 2001;
- Алгебра и начала анализа. 10 -11 кл.: Задачник для общеобразоват. Учреждений / А. Г. Мордкович, Л. О. Денисова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчикова. - 2-е – изд. – М.: Мнемозина, 2001;
- Рабочая тетрадь.



Опорные знания

Для успешного изучения данного учебного элемента вы должны знать:

- Что такое функция;
- Что такое числовая последовательность;
- Какими свойствами обладают числовые последовательности.

Предел числовой последовательности

Рассмотрим две числовые последовательности:



$$(x_n) : 2, 4, 6, 8, 10, \dots, 2n, \dots;$$

$$(y_n) : 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots, \frac{1}{2^n}, \dots$$

Изобразим члены этих последовательностей

точками на координатных прямых.

Обратите внимание как ведут себя члены последовательности.




Замечаем, что члены последовательности y_n как бы «сгущаются» около точки 0, а у последовательности x_n такой точки не наблюдается.

Но, естественно, не всегда удобно изображать члены последовательности, чтобы узнать есть ли точка «сгущения» или нет, поэтому математики придумали следующее...

Определение 1. Пусть a - точка прямой, а r - положительное число. Интервал $(a-r, a+r)$ называют **окрестностью точки a** , а число r - **радиусом окрестности**.

Геометрически это выглядит так:





Например

$(-0.1, 0.5)$ – окрестность точки 0.2, радиус окрестности равен 0. 3.

Теперь можно перейти к определению точки «сгущения», которую математики назвали «пределом последовательности».

Определение 2. Число b называют **пределом последовательности** y_n если в любой заранее выбранной окрестности точки b содержатся все члены последовательности, начиная с некоторого номера.

Пишут: $y_n \rightarrow b$.

Читают: y_n стремится к b .

Либо пишут: $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$.

Читают: предел последовательности y_n при стремлении n к бесконечности равен b .

Комментарий

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$. Возьмем окрестность точки r радиуса, r , то есть $(b-r, b+r)$. Тогда существует такой номер n_1 , начиная с которого все последующие члены последовательности содержатся внутри указанной окрестности, например, y_{n+1}, y_{n+8} и т. д., а вне этой окрестности содержится конечное число членов последовательности y_1, y_{n-1}, y_{n-5} и т. д.

При этом, если выбрать другую окрестность (другого радиуса), то для нее также найдется какой – то номер, начиная с которого все последующие члены последовательности будут попадать в указанный интервал.



Пример.

Существует ли номер n_0 , начиная с которого все члены последовательности (x_n) попадают в окрестность точки a радиуса $r = 0.1$, если

$$1. \quad x_n = \frac{1}{n^2}, \quad a = 0;$$

Решение.

$$\left| \frac{1}{n^2} - 0 \right| < 0.1$$

$$\left| \frac{1}{n^2} \right| < 0.1$$

$$\frac{1}{n^2} < 0.1$$

$$n^2 > 10 \Rightarrow (\sqrt{10}; +\infty) \ni n \Rightarrow n_0 = 4$$

Пример

Существует ли номер n_0 , начиная с которого все члены последовательности (x_n) попадают в окрестность точки а радиуса $r=0.1$, если $a=0$, $x_n = \frac{1}{n^2}$

Решение

$$\left| \frac{1}{n^2} - 0 \right| < 0.1$$

$$\left| \frac{1}{n^2} \right| < 0.1$$

$$\frac{1}{n^2} < 0.1$$

$$n^2 > 10 \Rightarrow (\sqrt{10}; +\infty) \ni n \Rightarrow n_0 = 4$$

Ответ: начиная с $n_0=4$ все члены последовательности (x_n) попадают в окрестность $(-0.1; 0.1)$



Практические задания

1. Запишите окрестность точки a радиуса r в виде интервала, если:
а) $a = 0, r = 0.1;$ б) $a = -3, r = 0.5;$
2. Окрестностью какой точки и какого радиуса является интервал:
а) $(2.1, 2.3);$ б) $(-7, -5)?$
3. Принадлежит ли точка x_1 окрестности точки a радиуса r , если:
а) $x_1 = 1, a = 2, r = 0.5;$ б) $x_1 = -0.2, a = 0, r = 0.3?$



Содержание

- Сходящиеся последовательности и их свойства, расходящиеся последовательности;
- Вычисление пределов числовой последовательности;
- Графический смысл предела;
- Сумма бесконечной геометрической прогрессии;
- Предел функции на бесконечности;
- Предел функции в точке.

Итоговое задание

Итоговое практическое задание

1. Существует ли номер n_0 , начиная с которого все члены последовательности (x_n) попадают в окрестность точки a радиуса r :

a) $x_n = \frac{1}{2n}$, $a = 0$, $r = 0,1$; б) $x_n = 3 + \frac{1}{n^2}$, $a = 3$, $r = 0,2$.

2. Постройте график последовательности y_n и составьте, если это возможно, уравнение горизонтальной асимптоты графика:

a) $y_n = 2 + \left(\frac{1}{2}\right)^n$; б) $y_n = 5 - \frac{2}{n}$.

Итоговое практическое задание

3. Найдите n -й член геометрической прогрессии (b_n) , если:

a) $S = 21, q = \frac{2}{3}, n = 3;$ б) $S = 20, q = 22, n = 4.$

4. Вычислить:

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)(n-3)}{n^2};$ б) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1-2n)(1+n)}{(n+2)^2};$

в) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(12 - \frac{1}{x^2} \right) \cdot \left(-\frac{8}{x^2} - 2 \right);$ г) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-4}{x+3};$

д) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x-1};$ е) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{16 - x^2}{64 - x^3}.$