


Класс двусторонне-симметричных водных беспозвоночных животных типа моллюсков.

К Двустворчатым моллюскам относится около **20 тыс. видов**.



1 – перловица, 2 – мидия, 3 – устрица, 4 - гребешок

Внешнее строение

Тело двустворчатых моллюсков продолговатое, двусторонне-симметричное, сплюснутое с боков.

Головы нет.

В теле различают туловище и у многих — ногу.



У беззубки нога имеет клиновидную форму. При этом моллюск выдвигает ногу вперед, затем расширяет ее, закрепляя в грунте, и подтягивает тело.


У мидии нога утратила двигательную функцию. Специальными железами мидия выделяет прочные белковые нити — *биссус*, с помощью которых она прикрепляется к камням.

У беззубки и мидии внутренняя поверхность раковины выстлана прочным блестящим перламутровым слоем. Инородные частицы (например, песчинки), попадающие между мантией и створкой раковины, обволакиваются слоями перламутра и превращаются в *жемчуг*.

Схема образования жемчужины




- 1 раковина
- 2 мантия (наружный слой)
- 3 песчинка
- 4 жемчужина



Внутреннее строение моллюсков

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Редукция головы у двустворчатых моллюсков привела к *исчезновению многих органов пищеварения:* глотки, тёрки, челюстей, слюнных желез.



Внутреннее строение беззубки при продольном (A) и поперечном (B) разрезе: 1 - нога; 2 — ротовое отверстие; 3 - пищевод; 4 — печень; 5 - желудок; 6 - кишка; 7 - сердце; 8 - почка; 9 - анальное отверстие; 10 — жабры; 11 — мантия; 12 — раковина; 13 — яичник

Внутреннее строение моллюсков

- □ Органы дыхания. У беззубки и мидии жабры пластинчатые. Они расположены под мантией с обеих сторон тела животного.
- ☐ Кровеносная система у двустворчатых моллюсков *незамкнутая*. В сердце у беззубки два предсердия и один желудочек.
- Выделительная система состоит из двух почек. Почки имеют вид двух обширных трубчатых, сложенных вдвое мешочков.



Внутреннее строение моллюсков

- □ Нервная система. Состоит из трех пар нервных узлов (нервных ганглиев) и многочисленных отходящих от них нервов.
- □ Органы чувств развиты слабо. Органами осязания служат ротовые лопасти. Осязательные клетки находятся также в ноге, по краю мантии и в жабрах.



Велико разнообразие размеров, строения и окраски раковин двустворчатых моллюсков. Так, гигант среди моллюсков вообще, обитатель тропических морей тридакна может достигать 250 кг веса, а длина ее мощной раковины 1,5 м. Наряду с этим размеры ряда обычных глубоководных моллюсков не превышают 2-3 мм.



Двустворчатых моллюсков добывают из-за их вкусного, очень полезного и легко усвояемого организмом человека мяса (как, например, устриц, мидий, морских гребешков).





CIACIDO 3A BHIMAHIE