



Красная книга Югры.

**А теперь, дружок,
давай познакомимся с Бабочками!**



Павлиноглазка обыкновенная




Размер бабочки - 25-40 мм. Самка обладает довольно медлительным полетом, активна в сумерки, тогда же откладывает яйца. Самец немного меньше самки, быстро летает днем в поисках испускаемого самкой запаха, который самец улавливает перистыми усиками. Бабочки не питаются.




Распространена по всей Европе. Обитает на полянах, в зарослях кустарников и на живых изгородях. Кормовое растение гусениц - вереск, ежевика, терн, таволга и другие разнообразные растения. Лет бабочки в апреле—июне. Зимует куколка в плотном коконе, сделанном из кормового растения.

Переливница Ирида

Размах крыльев 33-47 мм. Верхняя сторона крыльев чёрно-бурая, у самца с ярко-фиолетовым отливом, у самки тёмно-бурая без отлива с осветлённым краем. Переливы создаются не синим пигментом, а структурными окрасками, которые обусловлены частичным отражением синей составляющей спектра света. Самки крупнее самцов. Передние крылья с белыми пятнами (иногда исчезающими), задние с белой срединной перевязью и тёмным глазком, окружённым ржаво-красной каймой. Срединная перевязь на заднем крыле сверху даёт резкий острый зубец к краю. Ярко выраженных прикраев полос сверху нет. Нижняя сторона крыльев серо-бурая, с коричнево-ржавыми полями, чёрными и белыми пятнами и серо-зелёными базальными и прикраевыми участками. Снизу задних крыльев глазок в анальном углу чёткий, с голубой центрацией. Передние крылья без большой выемки по внешнему краю.



Парусник Махаон



Средние, крупные и очень крупные бабочки с богатейшим разнообразием окраски и рисунка крыльев, Размах крыльев до 28 см, у большинства видов — 50—130 мм, Голова округлая, глаза голые, усики булабовидные, относительно короткие (составляют $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$ длины костального края переднего крыла), покрыты чешуйками или голые. Все ноги у обоих полов полностью развиты и функционируют при хождении, покрыты чешуйками или голые. Переднее крыло треугольное, широкое, заднее — удлинено-овальное, с вогнутым анальным и округлым (*Parnassiini*) или волнистым внешним краем, у некоторых видов с хвостиком. Бабочки ведут исключительно дневной образ жизни, некоторые активны только в солнечную погоду.



Орденская лента голубая

- Самая крупная из наших ленточниц и одна из самых крупных европейских совок — длина переднего крыла может достигать 4,5 см, а размах крыльев — 110 мм (диапазон — от 85 до 110 мм). Передние крылья «синевато-светло-серые с черным опылением» и светлыми, до белого, поперечными линиями, окруженными каймой. Почковидное пятно светлое, с темной каймой, под ним располагается светлое или даже белое пятно неправильной формы. Задние крылья черные или темно-бурые, с голубой (причем не зубчатой, а полукруглой) перевязью и белой бахромкой. Время лета: вторая половина лета, с середины июля до середины октября.



Отряд Чешуекрылые, или Бабочки (Lepidoptera)

- Значение бабочек в природе, сельском и лесном хозяйстве очень велико. Некоторые виды бабочек способны размножаться в огромных количествах. В эти периоды они уничтожают листву и хвою деревьев, повреждая десятки и сотни тысяч гектаров леса, наносят ущерб садоводству, особенно фруктовым деревьям, уничтожают результаты труда овощеводов, нападая на капусту и корнеплоды, и т. д. Есть среди бабочек и полезные виды. Их разводят, например, с целью получения шелка из коконов.





Espresso



**Поздравляю с
получением
НОВЫХ знаний!**

